

Přeloženo do češtiny v úplném znění pouze pro soukromé informativní účely

Vitamín B17/Amygdalin

Metabolická léčba

Publikované worldwithoutcancer.org.uk (v překladu L.N.)

Vydavatel

Copyright ©2000

(autorské právo)

Adresa na vydavatele pro příp. otázky:

Worldwithoutcancer.org.uk

PO Box 2038

Leigh-on-Sea

SS9 2ZB

První edice, červen 2001

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo šířena v jakékoliv formě bez výhradního písemného souhlasu vydavatele. Publikace nesmí být šířena v oběhu v jakékoli jiné formě či jiným názvem než je publikována spolu i se všemi částmi v ní obsažené. Tato publikace může být stažena z internetu zdarma pro vzdělávací / informační účely, nemůže být reprodukována, šířena či, prodána bez výsostného souhlasu vydavatele.

PŘEDMLUVA

Podle Americké společnosti pro výzkum rakoviny (the American Cancer Society) ročně zemře na rakovinu 550 000 Američanů a u jednoho ze tří se objeví rakovina v průběhu života. To je 88 milionů lidí jen ve Spojených státech.

To, co budete na následujících stránkách číst, není odsouhlaseno (organizované / ortodoxní) medicínou (zdravotnictvím). The Food and Drug Administration (ve zkratce FDA, dále jen FDA; v překladu Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), the American Cancer Society (Americká společnost pro výzkum rakoviny) a Americká lékařská asociace to nazvali / označili jako "podvod" a "šarlatánství". V podstatě FDA a další vládní organizace použili a používají každý prostředek, který mají k dispozici k tomu, aby byla tato fakta zveřejněna. Věznili občany za pořádání veřejných setkání za účelem seznamování veřejnosti s jejich nevyvratitelným názorem v této věci. Zkonfiskovali knihy a filmy. Dokonce soudní stíhají lékaře, kteří podporovali tyto teorie ve snaze zachránit životy jejich pacientů.

Důvodem této publikace / brožury je poukázat na skutečnost, že tato lidská tragédie může být zcela zastavena a to na základě stávajících vědeckých znalostí. Informace, které budete číst v této brožure, Vás přivedou k důkazu, že rakovina je podobné onemocnění z nedostatku správné výživy, jako např.. kurděje (nemoc z nedostatku vitamínu C) nebo pelagra (nemoc z nedostatku vitamínu B3).

Rakovina nevzniká díky bakteriím, virům či záhadným toxinům ale absencí substance, kterou moderní člověk vyňal ze své stravy. Touto substancí je vitamin B17, též známý jako Amygdalin či Laetril. Pokud je tato analýza správná, pak lék a prevence proti rakovině může být zrealizována jednoduše. Vše co potřebujeme udělat je přehodnotit naše stravování a začít se stravovat zdravě. Rostoucí počet doktorů na celém světě nyní testuje a dokazuje na svých klinikách, že vitamínový koncept rakoviny je správný.

Jak zjistíte na následujících stránkách, existuje množství důkazů potvrzujících, že rakovina vzniká z důvodu nedostatečné výživy. Tento koncept neschvaluje konvenční / ortodoxní medicína, nicméně, důkazy jsou zde tak jasné, že dávají celkovou odpověď na otázku záhady rakoviny.

OBSAH

Publikované worldwithoutcancer.org.uk (v překladu L.N.)	1
Adresa na vydavatele pro příp. otázky:	1
První edice, červen 2001	1
PŘEDMLUVA	2
OBSAH	3
ÚVOD	4
Důležité upozornění	6
O vitaminu B17	7
Vitamín B17 jako prevence	9
Metabolická léčba rakoviny	10
Použití amygdalinu (VITAMINU B17) v metabolické léčbě rakoviny	12
FAQ (Nejčastěji kladené otázky)	16
POPIS JEDNOTLIVÝCH komponentů metabolického LÉČBY	28
Dodatkové metabolické doplňky (Běžně nepředepisované ale doporučené)	36
Přehled B17 metabolické léčby	40
Protokoly metabolické léčby B17	41
Co je metabolická terapie?	41
Běžné nastavení příslušenství léčby	43
ÚLOHA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ	47
PROVÁDĚNÍ ZMĚN	48
VITAMIN B17 A ANÉMIE ERYTROCYTŮ	49
KONTAKTY	50
V BOHU JE VÍRA	53
POZNÁMKY	53
POUŽITÁ LITERATURA	54

ÚVOD

V průběhu roku 1950 po několika letech výzkumu, vědě oddaný biochemik dr. Ernest T. Krebs, ml., Izoloval nový vitamin, který označil číslem B17 a pojmenoval ho ' Laetrile '. Jak roky plynuly, tisíce lidí začalo být přesvědčeno, že Krebs konečně objevil úplnou kontrolu nad všemi druhy rakovin a toto přesvědčení dnes sdílí mnoho lidí. V roce 1950 Ernest Krebs mohl mít jen malou představu o tom, do jakého vosího hnízda píchl. Jelikož farmaceutické nadnárodní společnosti nemohly patentovat nebo si nárokovat výhradní právo na tento vitamin, spustily proti B17 propagační útok nevídané krutosti, navzdory faktu, že konkrétní důkazy jeho účinku zvládnutí všech forem rakoviny nás obklopují v drtivém počtu. Proč ortodoxní medicína spustila válku proti“bezlékovému“přístupu? G. Edward Griffin, autor knihy Svět bez rakoviny tvrdí, že odpověď nenajdeme ve vědě, ale v politice a je založena na skrytých ekonomických a mocenských zájmech těch, kteří ovládají zdravotnické instituce.

Každoročně tisíce Američanů odcházejí do Mexika, aby podstoupili terapii vitamínem B17 (Laetril). Dělají to, protože to bylo v USA omezeno / zastaveno. Většinu těchto pacientů bylo řečeno, že jejich rakovina je v konečném stadiu a zůstává jim jen několik měsíců života. Přesto, neuvěřitelné procento z nich se zotavilo a vede normální život. FDA, AMA, American Cancer Society, a centra výzkumu rakoviny nadále prohlašují, že Laetril je podvod a šarlatánství. O zotavených pacientech říkají, že jejich nemoc spontánně ustoupila, nebo že vůbec rakovinu neměli. Pokud jakýkoliv z těchto pacientů po Laetrile zemře, mluvčí ortodoxní medicíny rychle prohlašují: “Vidíte? Laetril nefunguje!“ I navzdory tomu, že statisíce pacientů každoročně zemřou po operaci, ozařování, nebo chemoterapii, jsou tyto léčebné postupy jsou nadále propagovány jako “bezpečné a účinné“.

V USA se společnost FDA pokouší již 18 let využít striktní nařízení, ne zákon, na zákaz vitamínu B17. Terapie vitamínem B17 neboli laetrilu se používá jen v několika nemocnicích v Mexiku, které léčí rakovinu výživou. Tyto nemocnice dosahují téměř 100 % zotavení v nedotčených případech rakoviny (lokalizované tumory / rakoviny, které ještě nebyly zasaženy ozařováním, otrávené chemoterapií nebo do nich nebylo chirurgicky zasahováno). Většina z pacientů léčená pomocí laetrilu má pozitivní reakce počínaje nárůstem pocitu duševní pohody a optimističtějšího pohledu na život, jakož i zřetelné reakce jako zvýšená chuť k jídlu, nárůst hmotnosti a často obnovení přirozené barvy, snížení nebo odstranění bolestí spojených s rakovinou a pachou způsobené rakovinou. V tisících případech se potvrdila úplná regrese všech symptomů rakoviny.

Vitamin B17, obecně známý jako “Amygdalin“, nebo “Laetril“, je přirozená látka, která je obsažena v různých rostlinách. Největší koncentrace je v semenech ovoce, jako jsou jádra meruněk a jiných hořkých oříšků / jader. Existuje mnoho semen, obilovin a zeleniny, které obsahují minimální množství vitamínu B17 a tvoří část naší denní stravy. S velkým zadostiučiněním vám představujeme tuto rostlinnou látku, jejíž protirakovinné složení bylo empiricky známé roky, ale za ostatních dvacet let bylo vědecky dokázáno hlavně prostřednictvím klinických studií vedených dr. Ernesto Contreras Rodriguezem, které se uskutečnily v nemocnici OASIS of Hope Hospital dříve známé jako Centro Medico y Hospital Del Mar at Playas de Tijuana, BCN Mexico. Od roku 1963 více než 100,000 pacientů vyhledalo Dr.. Contreras. Následující informace vás seznámí s přínosem metabolické terapie a prevence. Všechny výživové doplňky uvedené v této brožurě si mohou pacienti (kteří si nemohou dovolit jít do Mexika z finančního hlediska, nebo jsou příliš slabí na cestování nebo již byly v těchto nemocnicích a potřebují zůstat na metabolické terapii) jednoduše zajistit (*pokud potřebujete informace a pomoc při pořizování jednotlivých komponent, kontaktujte: objednavka@mastercotrade.cz*). Naučíme vás jak profitovat z metabolické terapie v Mexiku nebo doma za zlomek nákladů. V zadní části této brožury najdete informace, kde je možné získat metabolické produkty.

Tato brožura je sumariací informací, které se nacházejí na naší webové stránce <http://www.worldwithoutcancer.org.uk>. Tam najdete takové cenné informace, jako jsou dokumenty, průzkumy a studie týkající se vitamínu B17, jeho monografické shrnutí, klinické studie, biologické a chemické popisy napadání a zničení rakovinných buněk komponenty léčby B17, certifikáty, pozadí případů, biografie, bibliografii, fotografie, grafy, linky a jiné. Tato brožura byla vytvořena, aby vám vysvětlila různé elementy metabolické terapie a působila jako zdroj, který můžete potřebovat během vaší terapie. Pokud máte nějaké dotazy, prosíme viz Často kladené otázky.

Důležité upozornění

Worldwithoutcancer.org.uk nepropaguje Laetril, ani jakýkoli jiný produkt, který se zde vzpomíná jako lék na rakovinu. Všechny zmíněné produkty jsou metabolické látky nebo vitamíny používané ve výživové terapii a prevenci. Naše informace i příběhy o úspěších jsou ze žurnálů a listů napsaných lékaři nebo lidmi, kteří prošli metabolickou terapií a kteří se chtěli podělit o své zkušenosti s druhými. Je důležité, abyste je hodnotili s určitou dávkou opatrnosti. Chceme vám je přiblížit, čímž však nenaznačuje, že budete mít stejnou zkušenost jako jejich pisatelé, ale máte právo utvořit si svůj vlastní názor.

Vládní organizace by byly raději, kdybychom stáhli tyto příběhy z veřejnosti, protože údajně jsou to "nedokazatelné tvrzení". Nicméně, jak jsme již uvedli, jediné co tvrdíme je, že tyto informace jsou autentické a že lidé, kteří je napsali, jsou skuteční. Pravda není pravda, pokud to není "celá" pravda a tyto příběhy o zdravotních úspěších a vědeckých studiích jsou stejnou částí pravdy jako jakýkoli úspěšný příběh a vědecká studie ortodoxní medicíny. Svobodní muži a ženy mají právo na přístup k "všem" dostupným informacím, aby se mohli moudře a informovaně rozhodnout v otázkách jejich vlastního zdraví. Proto se dělíme o tyto příběhy jako projev našeho práva na svobodu projevu a práva na svobodu informací.

Informace uvedené v této brožuře jsou určeny pouze pro vzdělávací účely. Všechny produkty uvedené v brožuře jsou výhradně určeny jako potravinové a dietní doplňky na zlepšení celkového zdravotního stavu a na posílení obranyschopnosti organismu vůči chorobám. Prosíme, vezměte na vědomí, že poskytnutím těchto informací se nepokoušíme diagnostikovat, léčit nebo předcházet nemocem. Nevysvětľujte si nic z této brožury jako medicínskou radu ohledně jakýchkoliv zdravotních problémů. Před aplikací jakékoliv terapie nebo produktu na váš zdravotní problém byste se měli poradit s důvěrným a uvědoměným lékařem (ideální je, pokud pracuje v oblasti metabolické medicíny. Pozn.. Spr). Většina z těchto informací není schválená oficiálním zdravotnictvím. The Food and Drug Administration, the American Cancer Society, and the American Medical Association je označila jako "podvod" a "šarlatánství".

Pokud byste se chtěli poradit s lékařem na výživu z nemocnice OASIS of Hope Hospital, prosím kontaktujte nás. Viz Kontakty

O vitaminu B17

Genesis 1:29 Potom Bůh řekl, "Dávám vám každou rostlinu se semeny na celém světě a každý strom, který má ovoce se semeny. Bude to vaše strava."

Navzdory velkým pokrokům v diagnostice a léčení zhoubných nádorů, rakovina i nadále zůstává jednou z hlavních příčin úmrtí ve vyspělých zemích. Bylo vypočteno, že každý třetí člověk zemře na nějakou formu rakoviny. Ačkoliv je pravdou, že operace a ozařování jsou schopné vyléčit některé pacienty s lokalizovanými nádory a že chemoterapií se vyléčí zhruba deset druhů zhoubných nádorů, celková úmrtnost na rakovinu se za 25 let nezlepšila. Skoro 60 procent všech pacientů po diagnóze rakoviny zjistí, že jejich nemoc je tak rozšířená, že dávky chemoterapie, které berou, nejsou dostatečné k jejímu potlačení a vyšší dávky nemohou dostat kvůli jejich vysoké toxicitě. Mnoho z nich nemůže být vystavena chemoterapii, operaci nebo ozařování kvůli vedlejším účinkům. Existuje i několik typů nádorů proti kterým dosud neexistuje žádná účinná léčba.

Worldwithoutcancer.org.uk vám s velkým zadostiučiněním představuje rostlinnou látku, jejíž protirakovinné složení bylo empiricky známé již roky, ale za posledních třicet pět let bylo vědecky prokázáno hlavně prostřednictvím klinických studií vedených renomovanými lékaři na výživu po celém světě. Mezi nimi jsou to dr. Ernesto Contreras Rodriguez, z nemocnice Oasis of Hope (dříve Centro Medico y Hospital Del Mar at Playas de Tijuana, BCN Mexico) ; dr. Harold Manner z kliniky Manner Clinic in Playas de Tijuana, Mexico ; dr. Hans Nieper, bývalý ředitel oddělení zdravotnictví v nemocnici Silbersee v Hanoveru ; N. R. Bouziane, MD, bývalý vedoucí výzkumných laboratoř v nemocnici St.Jean d' Arc Hospital v Montrealu ; Manuel Navarro, MD, bývalý profesor medicíny a chirurgie na univerzitě Santo Tomas v Manile ; dr. Shigeaki Sakai, prominentní lékař v Tokyu, Japonsko. V Itálii je to Profesor eToro Guidetti, MD, na univerzitě Turin Medical School, v Belgii je to Profesor Joseph H. Maisin, Sr., MD, na univerzitě Louvain kde byl vedoucím Institutu rakoviny. Ve Spojených státech jsou to renomované jména jako Dr. Dean Burk, bývalý vedoucí Národního institutu rakoviny ; dr. John A. Morrone z městského zdravotnického centra v Jersey ; dr. Ernst T. Krebs, ml., Který objevil Laetril ; dr. John A. Richardson odvážný lékař v San Francisku, který se postavil vládě proti pozastavení používání laetrilu ve Spojených státech; dr. Philip E. Binzel, ml., Lékař z Washington Court House, Ohio, který používal Laetril více než dvacet let s nevšedním úspěchem a mnoho dalších z více než dvacet zemí se stejně vynikajícími přínosy.

Tato protirakovinná látka je Vitamin B17 (známý jako Amygdalin nebo Laetril). Podle Dr.. Ernest T. Krebse ml., Obsahuje látky nezbytné pro život bez rakoviny. Největší koncentrace je v semenech ovoce jako jsou jádra meruněk a jiných hořkých oříšků / jader. Různé dokumenty z nejstarších civilizací jako byly Egypt v době faraonů a z Číny 2500 let před Kristem zmiňují terapeutické využití derivátů z hořkých mandlí. Egyptské papyry z před 5000 let vzpomínají používání "vody amigdalorum" k léčbě některých nádorů na kůži. Ale systematické studium vitaminu B17 ve skutečnosti nezačalo dříve než v první polovině minulého století, kdy chemik Bohn v roce 1802 objevil, že během destilace tekutiny z hořkých mandlí se uvolňuje kyanovodík (HCN - Hydrogen Cyanide). Brzy se několik výzkumníků začalo zabývat analýzou tohoto extraktu a tak poprvé p.. Robiquet a Boutron izolovali bílou krystalickou látku, kterou nazvali amygdalin (z amygdala = mandle).

V USA, Food and Drug Administration využilo vyhlášku, ne zákon, aby lékařům v některých zemích (ne všech) zakázaly terapii laetrilu používat. Neexistuje federální zákon proti laetrilu ani Laetril neobjevuje na oficiálním seznamu zakázaných léků. Food and Drug Administration také využil

vyhlášku, ne zákon, proti dovozu a prodeji laetrilu v rámci států tvrzením, že je to “necertifikovaný nový lék“ nebo “nebezpečná, falšování nebo návyková výživa“. Nic z toho není pravda a tvrzení jsou zavádějící. Amygdalin je extrakt z jader meruněk, a je výživovým doplňkem nic víc. Vitamín B17 byl předmětem velké polemiky před 18 lety, kdy několik špičkových světových vědců tvrdilo, že po konzumaci, jeho složky na 100 % zabrání vzniku rakoviny a zničí existující rakovinu.

Farmaceutické společnosti se okamžitě chopili tohoto tvrzení a požadovali od FDA okamžité provedení studií. Farmaceutické společnosti obvykle provádějí studie na patentovaných preparátech, které sami vynaleznou, takže nakonec, pokud by byl přípravek schválen, získají tak výhradní právo na jeho prodej. Nikdy však předtím neprovedli studie na potravinách, které nemohou být patentovány (a tedy bez markantních zisků) a které se prodávají v každém supermarketu (např. vitamíny).

Vitamín B17 jako prevence

Vitamin B17 je hlavní složkou potravy národů jako Eskymáků, Hunzů, Abcházijců a jiných. Věděli jste, že u nich nikdy nebyl zaznamenán výskyt rakoviny? Podle Dr. Krebse, potřebujeme minimálně 100 mg vitamínu B17 (ekvivalent 7 meruňkových jader denně) na prevenci proti rakovině. Potraviny obsahující vitamin B17 jsou následující:

Jadérka nebo semena ovoce: Největší koncentrace vitamínu B17 byla nalezena v hořkých mandlích, jablkách, meruňkách, třešních, nektarinkách, broskvích, švestkách, hruškách.

Luštěniny: semeno bobu obecného, cizrna, naklíčených čočka, naklíčená indická luštěnina (výhonek)

Ořechy: hořké mandle, makadamské oříšky, kešu oříšky

Bobule: ostružiny, šípky, brusinky, bezinky, jahody, maliny, většina lesních divokých plodů...

Semínka: len, sezam

Tráva: akácie, alfalfa (naklíčené), pšeničná, vodní tráva, *Sonchus oleraceus*

Obilí / zrna: ječmen, hnědá rýže, pohanka, len, proso, žito, vikev, pšenice

Různé: bambusové výhonky, *Fuschia* výhonek, čirok (sorgum), divoká hortenzie, tis (bodliny, čerstvé listy).

Podle Dr. Krebse, základním konceptem je dostatečný denní přísun B17, který může být realizován dvěma cestami:

První, jíst celé ovoce obsahující B17 (včetně jader), ale nesníst více jader než když jíte celé ovoce. Například: pokud sníte tři jablka denně, jádřka ze tří jablek jsou dostatečným přísunem B17. Neměli byste sníst kilo jablečných jader.

Druhá cesta, jedno broskvové nebo meruňkové jádřko na 4,5 kg tělesné váhy je dostačující v rakovině prevenci, ale množství závisí na konkrétním člověku a jeho stravy a metabolismu. 77 kilogramový muž například může zkonzumovat 17 meruňkových jader za den a dosáhne biologicky dostatečný přísun vitamínu B17. (60 kg osoba.... 13 jader)

A dvě důležité upozornění: Všeho moc škodí. Příliš mnoho jader nebo semen může vyvolat nežádoucí vedlejší účinky. Tato přírodní potrava by měla být konzumována v biologicky racionálním množství (ne více než 30 až 35 jader denně).

Vysoká koncentrace B17 je obsažena v přírodní potravě či v syrovém nebo naklíčeném stavu.

To ale neznamená, že rozumným vařením a jinou tepelnou úpravou bude obsah B17 zničen. Jídlo připravené vařením při teplotě dostačující pro přípravu čínské večeře neztratí obsah vitamínu B17. Jinými slovy, narychlo orestované.

Metabolická léčba rakoviny

Podle Harolda W. Manner, Ph.D.

Nadace metabolického výzkumu ve spolupráci s Manner Memorial Hospital a Cyto Pharma de Mexico, SA

Úvod

V posledních letech dochází k značnému přehodnocení povahy a příčiny rakoviny. Rakovina byla dříve považována za nemoc lokalizovanou (omezenou na jedno místo), charakteristickou poruchou, obvykle ve formě nádoru, který se objevil na nějakém specifickém místě v těle. Tato místní porucha se považovala za důsledek činnosti invazivního viru, karcinogenního činitele nebo nějaké formy traumatu jako např. úderu.

Dnes vzrůstá přesvědčení mezi výzkumníky a lékaři, že rakovina je komplexní nemoc, která je konečným důsledkem poruchy metabolismu (chemie těla). Je to zákeřná nemoc, která se týká celého těla, nervového systému, trávicího systému, slinivky, plic, vylučovacích orgánů a celého obranného systému. Zhoubný nádor po léčbě konvenčními metodami - operace, ozařování a / nebo chemoterapie se často znovu objevuje, protože metabolická příčina rakoviny se jen zřídka bere v úvahu a následně zůstává bez nápravy.

Etiologie (věda o příčině vzniku) rakoviny

V lidském těle existuje mnoho tisíc buněk, které jsou zastaveny již během jejich rozvoje v zárodečné fázi. Tyto buňky se nazývají mezenchymální buňky, fibroblasty (buňky pojivové vaziva), neoblasty a pod. Jejich primárním úkolem je oprava. Když je kost zlomená, tyto buňky jsou schopny se transformovat na kostní buňky. Pokud je krev zničena, tytéž buňky jsou schopny transformovat se na krevní buňky. Jsou skutečně multipotenciální a mohou reagovat na jakékoliv množství morfogenetického stimulu. Tytéž buňky, když jsou objektem zájmu karcinogenů (rakovinu způsobujících chemikálií) se transformují na rakovinné buňky. Každý den, v každém lidském jedinci, se velké množství těchto normálních zárodečných buněk stává rakovinných. Avšak jen zřídka vyvolají chorobu (rakovinu) a to díky pozoruhodnému systému těla, a to imunitnímu systému. Funkcí imunitního systému je zničit a neutralizovat všechny cizorodé látky v těle. Pokud se zárodečná buňka stane rakovinnou, z biochemického pohledu se stává cizí látkou v těle. Zůstáváme však i nadále zdraví, protože lymfocyty, makrofágy a další komponenty našeho imunitního systému jsou schopny neutralizovat a zničit tyto nežádoucí buňky a předejít jejich rozvoji a množení. Tyto rakovinné buňky jsou normálně zničeny našim ochranným mechanismem za pár hodin.

Nicméně pokud je imunitní systém oslaben špatnou výživou, nadměrnou znečišťující látkou (obvykle ze životního prostředí) nebo přetrvávajícím, vysilujícím stresem, pak se rakovinné buňky rychle množí a způsobují bujení a vznik rakoviny. Naš imunitní systém slábne obecně s přibývajícím věkem. Toto zvyšuje možnost vzniku degenerativních metabolických onemocnění. Jedním z hlavních úkolů metabolické léčby je revitalizovat imunitní systém a vrátit ho k plné funkčnosti. Úspěch tohoto úkolu dovolí imunitnímu systému eliminovat nebo negovat rakovinné buňky ještě předtím než mohou začít invazivně růst.

Metaboličtí lékaři a výzkumníci věří, že můžeme být stále zdraví, pokud zajistíme jednotlivým buňkám v těle náležité množství kyslíku, výživy, enzymů, minerálů, aminokyselin a dalších

nezbytných živin, a to ze stravy a výživových doplňků. Důležitá je také schopnost těla eliminovat odpadní látky z metabolismu buněk díky správnému fungování střevní činnosti, výkonným dýcháním, normálním vylučováním a pod. Léčení je úspěšné za předpokladu, že se pomůže tělu detoxikovat od škodlivých / zhoubných látek. Toto je podstata metabolické léčby. Je to vícesložkový program zahrnující množství souvisejících elementů, kde každý z nich hraje důležitou roli pro úspěšnost této komplexní léčby.

Použití amygdalinu (VITAMINU B17) v metabolické léčbě rakoviny

Francisco Contreras, M.D.

Oasis of Hope Hospital

Způsob účinku Amygdalinu

Metabolismus je souhrnná funkce našeho těla. Podmínkou správného fungování našeho těla je pracovat v harmonii (všechny jeho aktivity: fyzické, mentální, duševní). Cílem metabolické léčby je péče o všechny jeho složky. Všechny složky metabolické léčby jsou nezbytné pro zajištění nejlepšího prostředí v boji proti nemoci a nabytí zdraví.

Metabolická léčba je netoxická léčba rakoviny založená na vitamínu B17, proteolytických pankreatických enzymech, immuno – stimulantů, vitamínech a minerálních přípravečích. (viz Fáze I. a II.) Laetril (B17) je jedna z neznámějších protinádorových látek. Je to přírodní chemoterapeutický prostředek, který je obsažen ve více než 1200 rostlinách, nejvíce v jádrech ovoce jako jsou meruňky, broskve, švestky a jablka. Nazývá se též (Laetril) diglukosid s radikálem kyanidu, který je vysoce “bio - dosažitelný“. To znamená, že snadno proniká přes buněčnou stěnu, až do centra buňky. Tento radikál kyanidu je to, co dělá tento vitamín kontroverzním. Během let bylo ale prokázáno, že Amygdalin je zcela bezpečný a netoxický. Normální buňky v našem organismu obsahují enzym zvaný rodenáza (Rhodanese), který “neutralizuje“ amygdalin. Tento enzym nedovoluje amygdalinu uvolnit kyanid. V tomto případě, amygdalin slouží jen jako glukóza pro zdravé buňky a poskytuje jim energii. Rakovinné buňky neobsahují tento enzym. Absencí rodenázy je amygdalin aktivován a zapříčiňuje zničení rakovinné buňky uvolněním kyanidu. Zničeny jsou jen rakovinné buňky, přičemž zdravé zůstávají nepoškozené (selektivní toxicita). Jak amygdalin útočí na nezdravé buňky, je přetransformován do silikátu, který je podobný aspirinu. To přispívá značně k regulování bolesti. Stovky klinických studií vedených více příslušnými přírodovědci na celém světě včetně této, pod vedením Dr. Ernesta Contrerasa Rodrigueze z nemocnice Oasis of Hope Hospital v Mexiku, nám dává úplnou jistotu, že B17 není nebezpečný.

Laetril a život zachraňující substance zvaná kyanid

Dr. Philip Binzel, Jr.:

Lékař z FDA jednou řekl, že laetril obsahuje “volný“ hydrogen kyanid a proto je toxický. Chtěl bych opravit toto mylné tvrzení: V laetrile není “volný“ hydrogen kyanid. Když laetril přijde do kontaktu s enzymem beta - glukosidem, laetril je rozdělen na formu dvou molekul glukózy, tj. jednu benzaldehyd a jednu hydrogen kyanid (HCN). Rakovinné buňky v těle a POUZE rakovinné buňky obsahují tento enzym. Klíčovým slovem je, že HCN musí být vyroben! V laetrile není volně pohyblivý a pak uvolněný. Musí být vyroben. Enzym beta - glukosid, a pouze tento enzym je schopen vyrobit HCN z laetrilu. Pokud nejsou rakovinné buňky v těle, není ani beta - glukosid. Pokud není beta - glukosid, nebude vytvořen ani HCN, z laetrilu. Pro detailnější analýzu fungování laetrilu proti rakovinným buňkám, viz G.Edward Griffin, World Without Cancer (Thousand Oaks, CA: American Media, 1974).

Laetril obsahuje radikál kyanidu (CN). Stejný radikál kyanidu je ve vitamínu B12 a v ovoci jako jsou ostružiny, borůvky a jahody. Nikde neslyšíte o žádné otravě kyanidem z B12 nebo ledajaké otravě

uvedeným ovocem, neboť takových otrav není. Radikál kyanidu (CN) a kyanovodík (HCN) jsou dvě zcela rozdílné složky, tak jako sodík (Na⁺) - jeden je velmi toxická substance známá jako mankind - a chlorid sodný (NaCl), což je sůl, jsou to tedy dvě zcela rozdílné složky.

Pokud by výše zmíněné byla pravda, jak by pak mohla vzniknout fáma o tom, že laetril obsahuje "volný" kyanovodík? Vzešlo to od FDA (Food and Drug Administration). Pamatuji si, jak jsem četl článek v novinách (mohlo to být koncem let 60 -tých nebo začátkem 70 - tých) zprávu vydanou FDA. Jejich zveřejnění se týkalo zastánců látky nazvané "laetril" (nikdy jsem o tom předtím neslyšel), kteří říkají, že tato látka je schopna vytvořit kyanovodík v přítomnosti rakovinných buněk. Prohlášení pokračovalo tvrzením, že pokud toto je pravda, tak máme vlastně nalezenou látku, která byla specifickým cílem a mohla být skutečně cennou pro pacienty s rakovinou. Ale tato zpráva byla ukončena tvrzením, že FDA zrealizovala rozsáhlé testování této látky (laetrilu), jejímž výsledkem bylo, že nenašli důkaz o existenci kyanovodíku, nebo toho že by se uvolnil v kontaktu s rakovinnou buňkou. Laetril byl tedy proto, podle nich, bezcenný.


Když bylo později jasně prokázáno, že laetril uvolňuje hydrogen kyanidu v rakovinných buňkách, jak předpokládáte, že FDA reagovala? Potvrdily, že se mýlili? Potvrdily, že provedly velmi neadekvátní aktivitu v jejich testování? Ne! Prohlásili, že laetril obsahuje kyanovodík a proto je toxický !

A také; Úřad pro federální vládu, který krátce předtím, než to bylo prokázáno prohlásil, že důvod proč laetril nefunguje, je to, že neuvolňuje hydrogen kyanidu v rakovinných buňkách. Nyní, když zjistili, že to bylo prokázáno, tak řekli, že je toxický. Když byli vyzváni, aby odprezentovaly důkazy o toxicitě laetrilu na federálním soudu, tak potvrdili, že nemají žádné důkazy. (viz kapitola 1 Alive and Well autor dr. Philip Binzel, přístupná na: <http://www.realityzone.com> nebo viz Kontakty).

Grafické znázornění fungování laetrilu při rakovině

(grafická znázornění chemického procesu organického kyanidu při rakovině)

Zakladatel společnosti I.G. Farben, Co., Leibig, objevil amygdalin v roce 1822. I.G. Farbin je obrovský kartel zahrnující 2000 dalších kartelů. Krebs objevil L- Mandelonitrile - beta - glukosid v roce 1922 (externí). Beard publikoval o trofoblastu v britském medicínském magazínu Lancet av roce 1904 rozdiskutoval intrinsic factor chymotrypsinu. Byl to dr. Ernest T. Krebs, Jr., kdo objevil roli Nitrilosidu, externí faktor, znázorněno níže.



Přestože jsou jistá omezení (to ale neznamená, že není účinek) pro určité druhy rakoviny, vitamin B17 může být velmi efektivní pro nejvíce vyskytované nádory, jako jsou rakovina plic, prsu, prostaty, střeva a lymfatického systému. V roce 1981 se National Cancer Institut snažil silně propagovat jejich klinické pokusy a dokázat, že Laetril je toxický a neefektivní. Dnes Laetril zaujímá první místo v alternativní léčbě rakoviny. “Zjistili jsme, že Laetril je efektivní pro lidi, kteří mají aktivní rakovinu“, řekl Dr. Contreras,“ ale nejen při ní, funguje také jako prevence proti rakovině a pro udržení ústupu onemocnění, není nic efektivnější než Laetril. Jeho netoxičita povoluje jeho použití neomezeně (na neurčito) na prevenci proti metastázám a prevenci recidivy. Chirurgické zákroky, chemoterapie a radiace mohou být prováděny jen na určitý čas, pak je pacient ponechán bez jakékoliv ochrany“. Tato brožura Vás naučí jak začít a pokračovat v metabolické léčbě ve vlastním domě a v komfortu.

FAQ (Nejčastěji kladené otázky)

Přehled jednotlivých otázek:

1. Co je to Laetril (vitamin B17/Amygdalín)?
2. Kde si mohu vitamin B17 koupit?
3. Pokud je Laetril "nelegální" nebo "zakázaný", jak mohou některé firmy zrealizovat jeho zpřístupnění ve Spojených státech?
4. Jaká je doporučená preventativní denní dávka vitamínu B17?
5. Jaký je rozdíl mezi meruňkovými jádérky a vitamínem B17 -100 mg tabletkami používanými na prevenci? Je jeden lepší než druhý? Mám brát obojí?
6. Diagnostikovali mi rakovinu. Bude vitamín B17 fungovat na můj druh rakoviny?
7. Diagnostikovali mi rakovinu. Jakou dávku vitamínu B17 bych měl užívat, co mám užívat současně, a jak dlouho?
8. Je povinné brát jádérka i vitamín B17 když se podrobuji metabolické léčbě?
9. Jsou meruňková jádérka v pecce nebo ne? Musíme rozbít pecku kvůli vybrání jádérka ven?
10. Co bych měl brát spolu s vitamínem B17?
11. Jak mohu zrealizovat injekční formu podávání vitamínu B17?
12. Existují nějaká rizika spojená s injekční formou podávání vitamínu B17?
13. Mohu užívat vitamín B17 současně s chemoterapií nebo radioterapií, příp. pokud čekám na operační zákrok?
14. Podstoupil jsem chemoterapii, radioterapii a chirurgický zásah. Může mi ještě vitamín B17 pomoci?
15. Za jak dlouho je možné pozorovat výsledky léčení? Jak dlouho bude trvat zbavení se rakoviny?
16. Překonal jsem rakovinu, jsem vyléčen. Jaká je doporučená udržovací dávka vitamínu B17?
17. Jaká je úspěšnost s mým konkrétním typem rakoviny?
18. Proč běžní (ortodoxní) lékaři nepředepisují tento vitamín?
19. Pokud je rakovina metabolické onemocnění, jakou roli hraje životní znečištění v tomto procesu?
20. Je vitamin B17 nápomocný vůči devastujícím efektem nadměrného množství znečištění z prostředí nebo medicínské radioterapie?
21. Pokud máme jíst jádérka, proč nejsou naše zuby přizpůsobené na kousání pecek?
22. Jak uskladnit jádérka vyloupaná z pecky?

23. Mohl by vzniknout problém s užíváním léků na stávající choroby (cukrovka, vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, vředy, atd..) V současnosti užívám: Lipitol, Glynase, Ranitidine a občas Tylenol3.

24. Zajímalo by mě, jestli jsou zdokumentovány případy, kdy tato léčba selhala. Vše co vidím je zázračné léčení, ale jsou případy, kdy B17 nestačí?

25. Pokud vitamín B17 zabíjí rakovinné buňky, existuje možnost, že zabije i normální buňku?

26. Co říkáte na články publikované na internetu jako jsou:“Vzestup a pád laetrilu“autor: Benjamin Wilson, MD a Stephen Barrett, M.D. (zakladatel dohledu nad šarlatánstvím)?

1. Co je to Laetril (Vitamin B17, Amygdalin)?

Laetril, obecně známý jako vitamin B17 nebo amygdalin je přírodní chemoterapeutické látka nacházející se ve více než 1200 rostlinách, převážně v jádrech ovoce jako jsou meruňky, broskve, švestky a jablka. Je to diglykosid s radikálem kyanidu, který je vysoce "bio -dostupný". Znamená to, že proniká přes buněčné stěny, dostávajíc se hluboko do nitra buňky. Rakovinné buňky, nezáleží o jaký druh rakoviny jde, jsou známé jako trofoblasty (viz Trophoblastic Thessa of Cancer na <http://www.worldwithoutcancer.org.uk>). Tyto buňky obsahují enzym nazývaný beta - glukosid, také známý jako odemčený enzym. Když přijde Laetril do kontaktu s enzymem beta - glykosidů, Laetril se rozštěpí na 2 molekuly glukózy, jednu molekulu benzaldehydu a jednu molekulu kyanovodíku. V celém lidském těle, jen a jen rakovinné buňky obsahují tento enzym. Klíčovým momentem je, že HCN (hydrogen kyanidu) musí být VYTVOŘENÝ. Tedy není volně pohybující se v Laetrile a později uvolňující se. Musí být vytvořen. Enzym Beta - glukosid, a jen tento enzym, je schopen vytvořit z laetrilu HCN (hydrogen kyanidu), který napadá rakovinné buňky, a jen rakovinné buňky. Pokud v těle neexistují rakovinné buňky, nenachází se tam ani beta - glukosid. Pokud tam není beta - glukosid, tak nevznikne ani HCN (hydrogen kyanidu) z laetrilu. Zdravé buňky v našem těle obsahují enzym, který se jmenuje rodenáza a který "neutralizuje" Laetril. Tento enzym nedovolí laetrilu uvolnit kyanid. V tomto případě Laetril poskytne buňce jen glukózu a energii. Maligní / rakovinné buňky tento enzym nemají. Pokud v buňce absentuje enzym rodenáza, Laetril je aktivován, uvolní se kyanovodík, který zabije rakovinnou buňku. Detoxikaci kyanidu způsobuje v normálním tkáni savců enzym rodenáza, který v přítomnosti sírovo - nosných složek, přemění volný kyanid na thiokyanát (ang. Thiocyanate), absolutně netoxickou složku. Vylučuje se následně močí. (viz grafické znázornění jak reaguje laetril s rakovinou)

2. Kde mohu koupit vitamín B17?

Vitamin B17 můžete získat spolu s většinou metabolických produktů díky této brožurě na internetu. Prosím obraťte svou pozornost na konec této brožury, zdroje vitamínu B17 v Mexiku, ostatní v Anglii. Pokud žijete v USA nebude možné pro Vás obstarat vitamín B17 kvůli současnému zákazu FDA a celním omezením. V současnosti není možné B17 kvůli celním restrikcím dovézt ani do ČR. Pokud máte o B17 a preparáty zájem napište na: objednavka@mastercoimport.cz

3. Pokud je Laetril "nelegální" nebo "zakázaný", jak mohou některé firmy zrealizovat jeho zpřístupnění ve Spojených státech?

Neexistuje federální zákon vůči laetrilu ani nefiguruje na listině zakázaných léků. Stát Kalifornie má speciální zákon pro používání laetrilu na rakovinu, pokud je ta definována jako "oblast zmocňující se nového růstu" nebo nádor. Množství dalších států dělá léčení rakoviny laetrem nepřímou "ilegální" dávajíc poradenskému výboru pro rakovinu sílu regulovat používání jakýchkoli léčivých prostředků, ať už byly nebo nebyly zkoušeny. FDA používá regulace, ne zákon, kterými zakazuje vnitrostátní doručování nebo prodej laetrilu a to prohlášením, že je to "nelicencovaný lék, nebezpečný či falešný potravinový doplněk". Obě vyjádření jsou lživá. Vlastnictví laetrilu pro osobní účely není ilegální. De facto (ale rozhodně ne de jure) nelegálnost laetrilu má původ v FDA regulačním zákazu, speciálním Kalifornským zákoně a tlaku vyvíjeném vůči lékařům Státní komisí lékařské kontroly, která kontroluje licence lékařů. Je prakticky nemístné považovat laetril nebo vitamin B17 ilegální, neboť se považuje za výživu, podobně jako vitamin C či Niacin, které jsou

legální. V Kalifornii bylo prokázáno soudními rozhodnutími v mnoha případech, navzdory speciálnímu zákonu, že lékaři mají právo používat vitamín B17 jako metabolickou léčbu za předpokladu, že ho neprohlašují jako lék na rakovinu.

Na mexické hranici, celní správa USA povoluje vstup laetrilu bez zájmu či místopřísežného prohlášení, a to více než desetiletí. Amygdalin je výtazek z meruňkových jader, což vyjadřuje, že je to doplněk stravy a nic víc. FDA je dobře obeznámena, že jejich regulace jsou trochu průhledné a tak využívají typickou byrokratickou taktiku (mimo jiné změnu definic). Podle směrnic FDA, každá látka, která je používána k léčbě nemoci, může být klasifikována jako lék! Tato absurdní a velmi obecná formulace definice může zahrnovat i vodu, pokud je použita jako pomoc při dehydrataci. Zájemem FDA je pojmenovat COKOLI jako "nový lék", tj. každou nově vytvořenou substanci nebo dokonce pouze i doporučení jak se má daná substance užívat.

4. Jaká je doporučená denní dávka vitamínu B17 na prevenci?

Přestože konkrétní množství vitamínu B17 v prevenci proti rakovině nebylo oficiálně stanoveno, základním předpokladem je, že dostatečnou denní dávkou vitamínu B17 bychom mohli ohraničit podle následujících doporučení:

1) Podle Dr. Krebse, je to konzumace všeho ovoce, které vitamín B17 obsahuje (společně s jádřky) avšak neměli bychom zkonzumovat více samotných jádřek jako bychom je byli schopni sníst spolu s celým ovocem. Např.: Pokud sníte 3 jablka s jádřky za den, tato dávka je dostačující. Neměli byste sníst půl kila jablečných jádřek, protože nejste schopni sníst příslušný ekvivalent celých jablek jako takových.

2) Jedno broskvové nebo meruňkové jádřko na 4,5 kg váhy jedince se doporučuje jako dostačující dávka pro jedince na prevenci proti rakovině, i když přesné množství může také záviset na jednotlivém metabolismu nebo stravovacích návycích jedince. Např.: Muž vážící 80 kg může zkonzumovat 18 meruňkových jádřek denně. 2-3 tablety vitamínu B17 (100 mg) je akceptovatelné k pokrytí denní dávky.

Na závěr 2 důležitá upozornění: Všeho moc škodí. Konzumace přehnaného množství jader může způsobit nepříjemné vedlejší účinky. Přírodní množství jader by mělo být konzumováno v rozumné míře (ne více než 30-35 jádřek denně).

5. Jaký je rozdíl mezi meruňkovými jádřky a vitamínem B17 v 100 mg tabletách používanými na prevenci? Je jeden lepší než druhý? Mám brát obojí?

Dr. Krebs vždy doporučuje, že čistá forma vitamínu B17 (tj. meruňkové jádřko) je lepší než rafinovaná forma pokud jde o prevenci. Toto je pravda i u jiných potravin: Čistá forma vitamínu C (např. Grapefruits a pomeranče), je také lepší než tablety. Rozdíl mezi těmito dvěma formami vitamínu B17 je, že tablety jsou pohodlnější metodou užívání, jádřka mají hořkou chuť a proto někteří lidé preferují tablety. Někteří mají umělý chrup a je těžké pro ně jádřka kousat. Mnoho lidí bere obě formy. Je naprosto bezpečné brát obě formy. Mnoho pacientů s rakovinou bere až 4 - násobné dávky jader než jsou doporučené pro zdravé pacienty a 50 - krát vyšší dávky jeho tabletové

formy. Není třeba brát obě formy jak bylo uvedeno výše avšak můžete užívat obě formy v odůvodněném množství denně.

Důležité: Pacienti s rakovinou však požadují vyšší, více rafinovanou formu vitamínu B17. To by bylo nemožné dosáhnout pouze jedením jadérek, navíc jedení příliš velkého množství jadérek může způsobit nežádoucí účinky. (viz Fáze I. a II. Metabolické léčby)

6. Diagnostikovali mi rakovinu. Bude vitamín B17 účinný na můj druh rakoviny?

Dr. Krebs říká“ano“. Všechny rakovinné buňky mají přesně stejné pro ně typické znaky. Rakovinné buňky, bez ohledu na typ rakoviny, jsou známé jako trofoblasty. Tyto buňky obsahují enzym zvaný Beta - glukosid, také známý jako nevázaný / odemčený enzym. Když laetril přijde do kontaktu s enzymy beta – glykosidů je rozdělen do dvou molekul glukózy, jedné molekuly benzaldehydu a jedné molekuly hydrogen kyanidu (HCN). Rakovinné buňky v těle a POUZE rakovinné buňky obsahují tento enzym. Heslem je, že HCN musí být vyroben ! Není volně proměnlivý v laetrilu a pak uvolněný. Musí být vyroben. Enzym beta glukosid a pouze tento enzym je schopen vyrobit HCN z laetrilu. Pokud nejsou rakovinné buňky v těle, není ani beta - glukosid. Pokud není beta - glukosid, nebude ani vytvořen HCN z laetrilu. (viz jak funguje amygdalin)

7. Diagnostikovali mi rakovinu. Jakou dávku vitamínu B17 bych měl užívat, co mám užívat současně, a jak dlouho?

"Když máte rakovinu je velmi důležitá jednoduchá formule, dát maximální množství vitamínu B17 do vašeho těla v co nejkratším čase. - Ernest T. Krebs, Jr..

Mnoho lidí užívá B17 a pouze B17, a mnoho lidí ho objednává jen jako část kompletní metabolické léčby. Ideální je brát vitamín B17 jako součást metabolické léčby, která je mnohostrannější a zahrnuje množství souvisejících složek, kde každá z nich hraje svou důležitou úlohu ve prospěch vyléčení se. (viz metabolická léčba)

Abychom ale plně odpověděli na otázku doporučených léčiv a jejich množství, uvádíme doporučení dr. Contrerasa z kliniky Oasis of Hope.: Iničiální fáze (Fáze I.): amygdalin (Vitamin B17) 6 gramů, intravenózně (nejefektivnější metoda), 1 - krát denně po dobu 21 dní. (2 ampulky přímo do žíly nebo katetru) - viz protokol nebo: amygdalin 3 gramy (6 x 500mg tablety), orálně, denně po dobu 21 dnů (viz protokol) S laetrem podávají v OASIS Hospital pancreatické enzymy, Vitamin C, Pangamic Acid (B15), AHCC (active Hexose Correlated Compound), žraločí chrupavku (100 % čistou), vitamin a (emulzovaný), mladý ječmen, antioxidanty, a další živiny. Podstatou je pomoci tělu velmi agresivně bojovat proti rakovině bez poškození pacienta, pokud se imunitní systém posílí.

Následná fáze (Fáze II): amygdalin (Vitamin B17) 2 gramy (4 x 500mg tablety), orálně, denně, následující tři měsíce, spolu s ostatními komponenty metabolické léčby pro fázi II. Podle protokolu.

Po fázi II: fáze III metabolické léčby závisí na výsledcích fáze II, pokud nastala remise stačí jen udržovací dávka - viz Udržovací dávka podle protokolu. (pokud ne, tak se pokračuje ve fázi II.)

Vitamin B17 je ve vodě rozpustný a netoxický. Je bezpečný jako cukr nebo voda a bezpečnější než aspirin. Malé procento lidí pociťuje nevolnost když užijí najednou vysokou dávku B17. To se stává i když užijete najednou velké množství cukru, soli, nebo vody. V takovém případě je vhodnější rozdělit

B17 na více menších dávek na den. Pokud máte rakovinu měli byste užívat 6 až 10 tablet 500 mg B17 za den po dobu prvních 21 až 30 dní. Pokud pociťujete nevolnost, rozdělte si tablety na polovinu a berte je každou hodinu. Je osvědčené mít nějaké jídlo v žaludku, když je užíváte. Po první fázi, která trvá 21-30 dní, je dostačující dávka v druhé fázi 4-6 tablet (500mg) denně po dobu následujících 3 měsíců, podle protokolu, viz Fáze I., II.

8. Je povinné brát jádérka i vitamín B17 když se podrobují metabolické léčbě?

Dr. Contreras říká“ANO“. Jisté složky jáderek nejsou obsaženy v rafinované formě vitamínu B17 (rozuměj tabletové a injekční formě). Jádérka představují čistou formu vitamínu B17, obsahujíc mnoho důležitých živin, které znásobují účinek vstřebávání jednotlivých živin do těla. Během metabolické léčby se doporučuje brát tak jak lékovou formu B17 (ať už intravenózně nebo orálně) tak i jedení meruňkových jader a to v množství 1 jádérko na 4,5 kg váhy jedince. Pokud je snášenlivost těla na jádérka dobrá, může být tato dávka zvýšena na 30-35 jáderek denně. Důležité: Pro dospělého jedince se nedoporučuje více než 6 jáderek za hodinu nebo 30 na den.

Doporučujeme vzít v úvahu fakt, aby měl pacient v žaludku nějaké jídlo při požívání B17 ať už v tabletové nebo čisté formě. Pokud se konzumují jádérka je důležité konzumovat je s daným ovocem. Jako jsou např. meruňky, broskve, švestky, nektarinky, jablka, hrušky, třešně. V jejich dužině existuje něco co dokáže neutralizovat stopové kousičky Beta - glukosid obsažených ve slinách, žaludku a střevech, což je to, co někteří lidé pociťují jako nevolnost.

9. Jsou meruňkové jádérka v pecce nebo ne? Musím rozbít pecku kvůli vyjmutí jádérka ven?

Většina dodavatelů prodává již vyloupanuté meruňkové jádérka. Pro detailnější info viz si informace o jednotlivých produktech.

10. Co bych měl brát spolu s vitamínem B17?

Pokud máte rakovinu, Dr. Contreras (jeden z průkopníků B17 a primář v OASIS of HOPE klinice) doporučuje podstoupit metabolickou léčbu, která vyzbrojí imunitní systém na boj s rakovinou. Jejich speciální detoxikační program zajistí vše nezbytné pro dosažení nejlepšího výsledku. Contrerasův tým nasazuje spolu s laetrem (vitamínem B17) i pankreatické enzymy, vitamín C, žraločí chrupavku (100 % přírodní, čistou), vitamín A (emulgovaný), vitamín B15 (pangamická kyselina), antioxidanty, ovoce obsahující jádra s obsahem vitamínu B17 (konzumují se celé), a další živiny (viz metabolická léčba). Každá z těchto složek hraje důležitou roli pro úspěch vyléčení. Např. pankreatické enzymy se nacházejí v jejich přírodní formě v ananasu, papáje, a dalších. Také jsou produkovány slinivkou na trávení živočišných proteinů. Jejich úkolem je pomoci likvidovat negativní proteinový povlak nacházející se v těle, a tak chránit zranitelný imunitní systém před zrodem rakovinných buněk.

Hlavním úkolem metabolické léčby je obnovit rovnováhu. Bohužel, pacienti s rakovinou vyhledávají alternativní formy léčení až když je jejich tělo poškozené účinky chemoterapie, radioterapie, operačními zákroky nebo rakovinou samotnou. Právě kvůli tomu se klade důraz na přídatné výživové doplňky terapie v úsilí pomoci nastolit tak významnou rovnováhu v těle. Kloubní mazivo, kostní výživa a hovězí chrupavka mohou pomoci opět vytvořit kosti pokud máte rakovinu kostí. Houby

Sitak, MAITAKE (nejvíce studované houby) obsahují antivirovou substanci zvanou LENTINAN, která stimuluje imunitní systém a deaktivuje viry. Dalšími živinami, které jsou značně používány v protinádorové léčbě jsou Essiac formule (čaj), AHCC, koenzym Q10, výtažek z hroznových pecek, kočičí drápky, IP - 6, koloidní minerály, vitamin E, beta karoten, zázvor, multivitaminové minerály, antioxidanty, hydrazén sulfátu, echinacea, mléko bodláku, melatonin, surový brzlík. Většina z nich je dostupná díky vitamínovým společnostem. Mezi výzkumnými a holistickými lékaři převládá názor, že kombinace těchto terapií je účinnější než jen jedna samotná. Můžete si upravit svou metabolickou léčbu sami dle vašich specifických potřeb (viz informace o komponentech, v jejich bližší specifikaci)

11. Jak mohu zrealizovat injekční formu podávání vitamínu B17?

Jakákoliv sestřička nebo doktor může jednoduše provést návštěvu doma a aplikovat tuto formu B17. Je to zcela bezpečné a netoxické a nevyskytují se žádné vedlejší účinky. Poproste známou sestřičku nebo doktora nebo někoho kdo umí aplikovat injekce. Je důležité najít někoho kdo souhlasí s podáváním injekcí předtím než si tuto formu objednáte. Pokud byste potřebovali více informací z OASIS of Hope Hospital v Playas de Tijuana, Mexiku (10 minut jižně od San Diego, Kalifornie, USA), můžete navštívit web na <http://www.oasisofhope.com> tel.. UK 01702 480934 (viz Kontakty)

Nejlepšího efektu laetrilu lze dosáhnout když je součástí vyživovací nebo metabolické terapie, která umožňuje také užívání ostatních vitamínů, enzymů a stravy, ze které jsou vyloučeny živočišné proteiny. (viz fázi I., II.)

12. Existují nějaká rizika spojená s injekční formou podávání vitamínu B17?

Otázka by měla znít“jaké je riziko v případě jeho nepodání?“Tato forma vitamínu B17 není jen bezpečná a netoxická. Cukr nebo voda jsou více toxické. Většina léčených pacientů udává pozitivní reakce, jako jsou zvýšení radosti do života, optimističtější pohled na život, zvýšení chuti k jídlu, zvýšení hmotnosti, často obnovení přirozené barvy, zredukování nebo odstranění bolestí spojených s rakovinou a pachu způsobeného rakovinou.

13. Mohu užívat vitamín B17 současně s chemoterapií nebo radioterapií, příp. pokud čekám na operační zásah?

Lékaři na výživu se shodují, že vedle ortodoxní léčby je metabolická léčba nejen doporučována ale absolutně nezbytná. Ortodoxní lékaři používají chemoterapii, ozařování a operaci ve snaze léčit rakovinu i když častokrát zapříčiní poškození lidských orgánů a obranného mechanismu. (viz: The 4 Optional Modes of Cancer Therapy na <http://www.worldwithoutcancer.org.uk>). Rakovina je chronické porušení metabolismu a musí být i tak léčena. Slovo chronický znamená, že jakmile se projeví, bude pokračovat nekontrolovatelně a nenapravitelně, pokud se o to nepostaráme.“Metabolická“jednoduše znamená cestu, které přísluší péče o rozumné a vyvážené stravování s jejím faktory, ať už rozpustnými ve vodě nebo tuku (rozuměj vitamíny). Problém ortodoxní léčby je, že neléčí podstatu co zapříčinila onemocnění, ale její symptomy. Naproti tomu metabolická léčba je zaměřena na nepostačující výživu, což udrží tělo v boji proti rakovině posílením imunitního systému.

Ideální je zeptat se lékaře jaká úspěšná bude vaše léčba chemoterapií, ozařováním nebo chirurgickým zákrokem pro váš typ rakoviny. Poproste ho o pravdivé statistiky. Smíte ho dokonce požádat aby vám ukázal popis léků, které se stávají exponovanými podle PDR (Physician 's Desk Reference). Je to důležité vědět předtím než začnete léčbu, zda vám pomůže nebo uškodí. V mnoha případech je taková léčba horší než nemoc sama. Pokud máte plánovanou (nebo jste po) operaci nebo biopsii, kdy se rakovinné buňky poruší / porušily je nutné brát vitamín B17 na zničení zbývajících volných buněk (viz The Truth About Surgery and biopsie na <http://www.worldwithoutcancer.org.uk>). Vitamin B17 může jen pomoci a rozhodně neublíží.

* Clinical Oncology for Medical Students and Physicians, op. cit, pp.32, 34

* Spontaneous Regression of Cancer: The Metabolic Triumph of the Host !*, op. cit., pp. 136, 137.

14. Podstoupil jsem chemoterapii, radioterapii a chirurgický zásah. Může mi ještě vitamín B17 pomoci?

Dr. Krebs říká“ano“, a pamatujte: metabolická léčba vitamínem B17 pomůže tělu bojovat s rakovinou velmi agresivně bez jakéhokoliv poškození zatímco posiluje váš imunitní systém. Co neučiní, je oprava nenapravitelných poškození způsobených neúměrnou chemoterapií nebo ozařováním nebo rakovinou samotnou. Kdokoliv v jakémkoliv stádiu je kandidátem pro metabolickou léčbu.

15. Za jak dlouho je možné pozorovat výsledky léčení? Jak dlouho bude trvat zbavení se rakoviny?

Jsou dva typy výsledků, které jsou obvykle pozorovány při metabolické léčbě laetrilem. Jsou klasifikovány jako subjektivní a objektivní: Subjektivní výsledky je vidět vzápětí po zahájení léčby: Tyto zahrnují snížení bolesti, což způsobuje snížení frekvence dávkování narkotik nebo sedativ, zvýšení chuti do života, zvýšení apetitu, zmizení zápachu poranění, zvýšení energie nebo výkonnosti, projevující se v nárůstu hmotnosti a pevnosti svalů.

Objektivní výsledky zahrnují zlepšení výsledků krve a moči, zlepšení obnovy tkáně, snížení otoků, snížení ve výsledcích předpokládaného chorionimického (týkající se vnějšího zárodečného obalu) gonadotropinu v séru moči, a celková regrese všech symptomů nemoci. Objektivní výsledky se dostaví od 3 týdnů do 4 měsíců. Čas potřebný k dosažení maximálního účinku je 4 měsíce až rok. Mnoho záleží na kombinaci s jinými terapiemi, disciplíny a odhodlanosti pacienta.

Rakovinné buňky začnou být ovlivňovány okamžitě. V jistých případech, jako je rakovina kostí nebo mozku je zapotřebí více času na to, aby se vitamín absorboval hlouběji do těla. Podle Dr. Krebs rakovina kůže reaguje nejrychleji. Během jednoho týdne je patrný viditelný rozdíl a v mnoha případech je zaznamenána do tří týdnů úplná regrese všech symptomů. Nádoru může trvat několik měsíců dokud se úplně zmenší a v některých případech rakoviny děložního čípku tato zcela regresovala za méně než tři týdny.“

16. Překonal jsem rakovinu, jsem vyléčen. Jaká je doporučená udržovací dávka vit. B17?

Podle Dr. Krebse, by se mělo brát orálně 1 gram (1000 mg) vitamínu B17 denně. Nicméně někteří pacienti konstatují, že se cítí mnohem lépe nebo bezpečněji s 1.5 až 2.0 gramy B17 denně. Takže dávkování je dáno pacientovými pocity, jak se cítí silný, jakou má chuť k jídlu a psychologickým zlepšením (redukuje se úzkost, nervozita, a zvýší se optimismus a zájem o okolí.)

Abnormální situace, stres, nebo nemoc blízkého jsou známé tím, že může nově vyvolat nebo nastartovat rakovinový proces u některých pacientů. Pacienti, kteří mají rakovinu pod kontrolou by si měli být toho vědomi. Když je rakovina pod kontrolou více než dva roky a pacient má dobré výsledky, a je aktivní a plný energie a síly s negativním CGH testem moči, a s dobrými výsledky CT, MR, rentgenu, může dávkování snížit na minimálně 500 miligramů Vitamínu B17 na den.

17. Jaká je úspěšnost s mým konkrétním typem rakoviny?

Úspěšnost pro specifické typy rakoviny je závislá na stupni rakoviny a na poškození způsobeném chemoterapií, ozařováním, operací nebo samotnou rakovinou. Vitamin B17 může jen pomoci, ne uškodit. Pokud máte diagnózu rakovina, je ideální začít hned s metabolickou léčbou. Dr. Krebs potvrzuje 98 % úspěch v jejím panenském stadiu (primární nádor, bez metastáz, kdy pacient neměl chemoterapii, ozařování nebo operaci). V případech, kdy pacient absolvoval chemoterapii, ozařování nebo operaci závisí jak moc je rakovina rozšířená v těle a jak moc je tělo zasaženo touto léčbou. Ve všech případech je nutné začít metabolickou léčbu z důvodu opravy nedostatku výživy jako faktoru, který účinkuje vůči nemoci.

Abychom to shrnuli, pokud jste schopni jíst, udržet jídlo, močit a vyprazdňovat se, a vaše tělesné funkce jsou normální, jste perfektní kandidát pro metabolickou léčbu.

18. Proč běžní (ortodoxní) lékaři nepředepisují tento vitamín?

Odpověď na tuto otázku je nad rámec toho, jak jsme schopni zodpovědět v takto malé sekci. Mr. G. Edward Griffin to horlivě popisuje ve své knize, celá její II.část "The Politics of Cancer Therapy" (Politiká léčby rakoviny), kde podává podrobné příklady nečestnosti a korupce v oblasti výzkumu léčiv / léků, který se týká uzavřeného pohledu významné studie, kde je laetril deklarován jako "bezpečný" důkaz, či podvod. Autor také pojednává o FDA bojující proti používání laetrilu, který nebyl nikdy testován a jeho zamítnutím povolit komukoliv otestovat ho. (kromě jeho oponentů). Autor nahrál dostupné videokazety: "The Politics of Cancer Therapy"; recenzi vědy o léčení rakoviny; shrnutí o politice v léčení rakoviny, počáteční historii chemického a farmaceutického kartelu IG Farben; kartelový okamžitý úspěch ve Spojených Státech a jejich "manželství" se společnostmi DuPont, Standard Oil a Ford; vliv tohoto farmaceutického kartelu nad státními zdravotními školami; jejich lékově orientované školení pro absolventy medicíny a využívání dobročinných nadací za cílem dosáhnout kontroly nad vzdělávacími institucemi. Tyto kazety jsou dostupné na webové stránce M. Griffina: <http://www.realityzone.com>.

Abychom to shrnuli: většina lékařů je povinna používat a předepisovat jen ty léky, které jsou povoleny, i když nejsou úspěšné. Většina lékařů není obeznámena s tím, jak předepisovat výživu a její význam na léčení nemocí. Učí se jen jak léčit symptomy nemocí, zatímco skutečné příčiny nemocí se nezjistí a neopraví. Pro vaše plné obeznámení se s nemocí, začněte s knihou v češtině Phillipa Daya "RAKOVINA - proč stále umíráme bez poznání pravdy", kterou si můžete objednat na damiensk@hotmail.co.uk, a knihou v angličtině Mr. Griffina: "World Without Cancer" (Svět bez

rakoviny). Můžete si ji zakoupit na internetu na adrese: <http://www.realityzone.com>. Tyto knihy jsou jedněmi z mála, které Vám řeknou pravdivý příběh o vitamínu B17 a provede vás detailními informacemi v otázkách rakoviny.

19. Pokud je rakovina metabolické onemocnění, jakou roli hraje životní znečištění v tomto procesu?

Škodlivé / jedovaté látky (toxiny) napadají játra, která je důležitým detoxikačním orgánem v těle. Pokud játra detoxikují např. nadměru estrogenu a výkonnost jater je oslabena toxiny, tak hladiny estrogenu mohou dosáhnout dostatečné koncentrace pro navození / vyvolání rakoviny.

20. Je vitamin B17 nápomocný vůči devastujícím efektům nadměrného množství znečištění z prostředí nebo medicínské radioterapie?

Ne, a to dá zdravý rozum. Nikdy během celých dějin nebyl výskyt tak vysoké koncentrace radiace předpokládán. Organismus je zatížen / zasažen takovou nadměrnou dávkou, že neexistují žádné mechanismy, včetně vitamínu B17, které by napravily defekty tak prudké radiace. Takový útok na živý organismus je jeden z nejdevastačnějších jaké může živá tkáň utrpět. Nejenomže napadá jednotlivce dané generace ale může ochromit, pokud ne zničit, nesmrtelnost zárodku plazmy, na které stojí sám živočišný či rostlinný druh jako takový.

21. Pokud máme jíst jádérka, proč nejsou naše zuby přizpůsobené na kousání pecek?

Existuje společenství lidí, které se nestalo tak porouchaných sofistikovaností moderní technologie. Tito lidé jsou schopni kousat pecky. Dokonce můžeme vidět psy jako koušou pecku, aby se dostaly k jádérku. Veverky, burunduk, medvědi a vyšší primáti jako jsou opice to běžně dělají. Pečovatelé v ZOO zjistili, že když krmí opice čerstvými meruňkami, broskvemi a švestkami, tak se na ně vrhají dokud už nemají dost a pak už si jen dělají zásoby pecek, které se snaží rozbít, aby se dostaly k jádérku. Primáti je berou do rukou a snaží se je boucháním o kus betonu rozbít. Jedení těchto jáderek je univerzálně mezi Nomády a vyššími živočichy.

22. Jak uskladnit jádérka vyloupená z pecky?

Můžete je skladovat neomezeně, pokud jsou neprodyšně zabalena a zamrazené. Pokud je nezamrazíte, vitamin B17 se neztratí ale nenasyčené mastné kyseliny se po pár měsících rozloží, čímž znehodnotí jádérka.

23. Mohl by vzniknout problém s užíváním léků na stávající choroby (cukrovka, vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, vředy, atd.) V současnosti užívám: Lipitol, Glynase, Ranitidine a občas Tylenol3

Odborníci na výživu tvrdí, že rakovina je lokální projev systematického nebo výživového (metabolického) onemocnění. To znamená, že vaše současné problémy mohly být příčinou vzniku zhoubného nádoru. Metabolická léčba léčí celý organismus, nejen rakovinu.

Odpověď na otázku je ano, můžete současně s metabolickou léčbou užívat jakékoli léky, které užíváte. Neznáme zatím žádnou substanci, která by měla nepříznivý účinek jako laetril (vit. B17). Nezapomeňte, že laetril není lék ale VITAMIN nebo potravinový doplněk.

Podstatou je, že metabolická léčba nám zajistí zdraví a tím pádem nebudete muset záviset na těchto lécích po zbytek vašeho života.

24. Zajímalo by mě, jestli jsou zdokumentovány případy, kdy tato léčba selhala. Vše co vidím je zázračné léčení, ale jsou případy, kdy B17 nestačí?

Ano. Bohužel, v případech kdy se pacient dostal k vitamínu B17 v době, kdy absolvoval chemoterapii, radioterapii, operaci, čímž došlo k značnému poškození organismu touto ortodoxní medicínou a také rakovinou samou. Tedy pokud se pacient dozvěděl o tomto charakteru léčení vitamínem B17 a bylo už pozdě. B17 je jednoduchá a přírodní výživná látka, která za správných okolností pomůže tělu zbavit se rakoviny li součástí metabolické léčby, která kromě B17 zahrnuje další vitamíny, enzymy a stravování s vyloučením živočišných proteinů. Nepleťte si to se zázračným lékem, který zničí rakovinu a vytvoří nové tělo.

25. Pokud vitamín B17 zabíjí rakovinné buňky, existuje možnost, že zabije i normální buňku?

Absolutně NE. Výzkum ukazuje, že normální zdravá buňka v našem organismu obsahuje enzym, zvaný rodenáza (Rodhanese), který neutralizuje amygdalin (vit. B17). Tento enzym nepovoluje amygdalinu uvolnit kyanid. V tomto případě, amygdalin poskytne buňce pouze glukózu, tedy energii. Zhoubné buňky tento enzym neobsahují. Pokud buňka neobsahuje enzym rodenázu, amygdalin aktivuje uvolnění radikálu kyanidu jen uvnitř zhoubné buňky a způsobí její zničení (více viz info: Laetril a kyanid)

26. Co říkáte na články publikované na internetu jako jsou: “Vzestup a pád laetrilu“ autor: Benjamin Wilson, MD a Stephen Barrett, M.D. (zakladatel dohledu nad šarlatánství)?

Na internetu bylo zveřejněno množství článků s cílem jasně zdiskreditovat laetril, čímž jednoznačně jedna ze zúčastněných stran nemá pravdu. Věnovali jsme celé dvě sekce na naší webové stránce na vyvrácení všech obvinění, abyste si sami udělali názor či úsudek. Jste vítáni navštívit naši webovou stránku: <http://www.worldwithoutcancer.org.uk> a prohlédnout si to osobně. Dovolte nám zatím přiblížit vám kdo ve skutečnosti je Stephen Barrett:

V rozhovoru provedeném Marjorie Rosen v magazínu Biography Magazine mu byla položena otázka: zda se lidé mohou obrátit se svými konkrétními otázkami na Quackwatch (Dohled nad šarlatánství). Jeho odpověď zněla: “Ano, denně zodpovíme 25 individuálních otázek. Lidé posílají e-maily. Jakmile se přihlásím na internet, přibližně 80 % jejich dotazů je zodpovězeno za 10 minut. Mám poradní výbor s více než 100 experty a do roku je budou moci lidé kontaktovat přímo a dostat fundovanou odpověď. To je ohromně významné.“

V e-mailu odeslaném Mr. Barrettovi v pátek, 30.října 1998 v 11,22 hod., ve kterém jsem položil tyto otázky:

Dr.Barrette,

1) Zdá se, že jste velmi fundovaný v oblasti výživy. Ale i tak by mě zajímalo, kde jste získali toto vzdělání, protože jsem to nenašel ve vašem životopise a vím, že na medicíně (rozuměj zdravotní škola) se lékaři o výživě neučí. Mohli byste doplnit toto vzdělání ve vašem životopise?

2) Víím, že jste obdrželi speciální ocenění od komisaře FDA za službu společnosti v boji proti šarlatánům, kteří léčí lidi výživou. A přesto jste se v r. 1986 staly váženým členem Americké stravovacího asociace (the American dietetic Association). Moje otázka zní: Věříte nutriční terapii nebo ne? A pokud ano, který druh výživové terapie doporučujete tomu, kdo se o to zajímá? Kterou terapii (výživovou) byste nenazvali "šarlatánství"?

3) Četl jsem, že podle Americké společnosti pro rakovinu, více než 500 000 lidí zemře ročně na rakovinu v USA. A podle výzkumů se statisticky ukázalo, že člověk s rakovinou má větší pravděpodobnost žít déle a cítit se lépe, pokud nedělá nic, než když podstoupí operaci, chemoterapii nebo radioterapii. Co si o tom myslíte?

4) Věříte, že vitamíny, minerály a doplňky nebo raději jen "výživu", že pomáhá tělu v jeho schopnosti bojovat proti nemoci?

Děkuje za vaši čestnou a rychlou odpověď.

Odpověď dr. Barretta v pátek, 30.října 1998 o 15,14 hod.:

Promiňte, ale odpovídat na vaše dotazy by mi zabralo více času než jsem schopen investovat. Pokud byste rádi věděli čemu věřím, přečtěte si mou knihu: "The Vitamin Pushers" (Dealer vitamínů) - chápej ilegální, Stephen Barrett, MD, Board Chairman, Quackwatch, Inc.

Email: sbinfo@quackwatch.com

Telephone: (610) 437-1795

Dne 23. listopadu 1999 jsem poslal dr. Barrettův následující e-mail, za kterým následuje jeho odpověď:

WWC (worldwithoutcancer): velmi informativní webová stránka a myslím, že mám jednu kuriózní otázku. Přečetl jsem si váš životopis a certifikáty, vypadají senzačně. Mám pro vás otázku jen ze zvědavosti. Jste křesťan? A následující bude znít trochu osobně ale byl bych velmi rád, kdybyste mi odpověděli. Věříte v evoluci nebo stvoření?

Subj.: Re: Dear Dr.. Barrett

Date: 11/23/99 8:58:03 AM Pacific Standard Time

From: sbinfo@quackwatch.com (Stephen Barrett, MD)

To: admin@worldwithoutcancer.org.uk

Nejsem nábožensky založen.

Uznávám vývoj / evoluci faktů.

Shrnutí:

Poté, co Dr. Barrett očividně věří v evoluci, že se vyvinul z bakterie a následně z opice během období bilionů let, a že nevěří, že existuje bůh, pak vše co hlásá na jeho webové stránce se jeví sporné a pochybné. Navštiv naši webovou stránku (<http://www.worldwithoutcancer.org.uk>) a viz si naši odpověď na jeho dílo: "the Rise and Fall of Laetril" (Vzestup a pád laetrilu). Pro pravdu v boží slova, předvádějící dokonalou harmonii biblického vysvětlení s faktickou vědou a historií navštivte webovou stránku Dr. Kenta Hovindsa: <http://www.drdino.com>

POPIS JEDNOTLIVÝCH komponentů metabolického LÉČBY

Injekční forma (intravenózní) vitamínu B17/Laetrilu/Amygdalínu

V Mexiku je vitamin B17 podáván intravenózně během metabolické léčby v její první fázi a to 21 dní a pak orálně v její následující fázi II. Některé společnosti vedou skladem injekční formu v 3gramových ampulkách (viz Kontakty na konci této brožury). Mohou také dodávat spolu s injekčními stříkačkami, pokud je to legální v dané zemi. V jednom balení se nachází 10 ampulí. V mexické nemocnici OASIS OF HOPE podávají 6-9 gramů denně v prvních 21 dnech. Podle potřeby, dávky mohou dosáhnout až 15 gramů denně (5 ampulí). Dr. Harold Manner a Ernesto Contreras to takto používají v jejich léčebné kúře. Injekční B17 je konstantně podávána spolu s tkáň pronikající látkou DMSO - dimethyl sulfoxide. (informace o tom, jak někteří lékaři aplikují DMSO viz info dále).

Důležitá poznámka: Klinické testy opakovaně prokázaly, že vitamin B17 je skutečně efektivní pouze tehdy, pokud se podává spolu s pankreatickými enzymy, aby dokázal překonat vnější obal rakovinné buňky. Vitamin A & E v jeho emulzní formě spolu s vysokou dávkou vitamínu C, B15, antioxidanty a ostatními výživovými látkami pak spolu v kombinaci s vitaminem B17 působí na zničení rakovinné buňky. Klinické podávání metabolické léčby vždy tyto komponenty obsahuje.

* Manner, HW, Michaelson, TL, and DiSanti, SJ. "Enzymatic Analysis of Normal and Malignant Tissues." Presented at the Illinois

State Academy of Science, April 1978. Also, Manner, HW, Michaelson, TL, and DiSanti, SJ, "Amygdalin, Vitamin A and Enzymes

Induced Regression of Murine mammary adenocarcinoma", Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Vol. 1, No. 4,

Prosinec 1978. 200 East Roosevelt Road, Lombard, IL 60148 USA

Vitamín B17/Laetрил/Amygdalín tablety

Orální (tabletové) podávání vitamínu B17 je nejpohodlnější a najfrektovanější metoda. Tyto tablety obsahují aktivní B17 složky, vytěžené z meruňkových jader. Obvykle jsou dostupné ve 100 mg a 500 mg tabletách. Někteří lidé jsou zmateni termíny Laetрил a Amygdalin. Tyto názvy však ve své podstatě pojednávají o téže směsi, vitamínu B17 a jsou v každém smyslu a případě zaměnitelné / nahraditelné. Tyto tablety se vždy berou spolu s meruňkovými jádérky. Dr. Contreras doporučuje:

2-4 100 mg tablet denně jako výživový doplněk na prevenci

4-6 500 mg tablet denně jako doplněk stravy pro pacienty trpící rakovinou beroucí současně s enzymy, antioxidanty a dalšími doplňky léčby (viz Fáze I., II.)

Dr. Krebs říká: "Někteří pacienti s nedostatečnou žaludeční kyselinou mohou mít při orálním užívání B17 vedlejší účinky jako slabost, či bolesti hlavy. Tyto je možné odstranit požíváním citrusových džusů nebo grapefruitového džusu nebo tablet kyseliny solné (hydrochloric acid) i betain solný."

Tento pankreatický enzymový přípravek obsahující trypsin a chymotrypsin je zahrnut jako nezbytná součást vitamínu B17 léčby. Orální dávka p

Megazyme Forté Enzyme Supplement

Tento pankreatický enzymový přípravek obsahující Trypsin a Chymotripsyn je zahrnutý jako nevyhnutelná součást léčby pomocí vitamínu B17. Orální dávka pankreaticko - enzymatického přípravku je obvykle 3 tablety 3 - krát denně dvě hodiny po každém jídle (dohromady 9 tablet denně). BROMELAIN (Bromelin) je také zahrnut v terapeutickém režimu pro jeho proteolytický efekt a pro eventuální synergický efekt při styku s vitamínem B17 (doporučuje Dr. Nieper).

Dr. Ernest T. Krebs také udává: "neskrývaný efekt těchto tří enzymů proti vnější buněčné vrstvě maligní buňky je něco velmi konkrétního v imunologii rakoviny. Vřele doporučuji, raději než užívání bromelinových či papaya tablet, příjem těchto enzymů přímo z čerstvého vyzrálého ovoce jako je ananas a papaya. Takové množství než polovina ananasu by mělo být přijímáno v potravě (čerstvé)"

Enzymový přípravek doporučený Dr. Krebsem, Dr. Hansem Nieperem a dr. Philipem Binzelem by měl být PH - senzibilní a střevně pokrytý. Nejideálnější je, aby také obsahoval následující ingredience:

Pancreatin..... 1250mg

Papain..... 150mg

Bromelain.....	150mg
Trypsin.....	125mg
Lipase.....	50mg
Amylase.....	50mg
a - chymotrypsin.....	45mg
Rutin.....	100mg
Raw calf thymus concentrate....	55mg
Zinc gluconate.....	10mg
Super oxide DISMUTASE.....	50mcg
Catalase.....	200 Units
L- Glutathione.....	10mg

Emulgován Vitamin A

V roce 1963 když Dr. Ernesto Contreras začal své aktivity v klinické onkologii, použití vitaminu A jako prospěšné látky / činidla při zhoubném nádoru bylo považováno za nelogické a absurdní. Dnes je vitamin A považován za prospěšnou látku a hojně využíván hlavně při rakovinách epitelu (výstelky) jakož i kožních nádorech, ať již při chronické leukémii nebo přechodných buňkách.

První oficiální studie o možnosti protinádorového účinku vitaminu A byla zahájena v Německu výzkumníky laboratoří MUCOS v Mnichově. Byl prokázán efekt, že rakovina plic u norských námořníků byla méně běžná než u ostatních skupin a to i přesto, že námořníci byli kuřáky už od dětství. Logicky by z toho mělo plynout, že by to mělo být naopak. Po studiu tohoto fenoménu bylo zjištěno, že tato skupina lidí konzumuje už od dětství hojné množství syrových rybích jater, které jsou bohaté na vitamin A. Logickým závěrem je, že tak vysoké množství tohoto vitamínu chrání tuhé kuřáky před vznikem rakoviny plic. Také bylo zjištěno, že vysoké množství vitamínu A je toxické a může způsobit nepříznivé reakce.

Hlavním záměrem bylo zjistit, jaké množství vitaminu A je vhodné, aby zabezpečilo léčící účinky a přitom neškodilo játrům. Toto rozluštil jeden výzkumník, který zjistil, že přirozené mateřské mléko obsahuje tento vitamín a děti krmené z prsu nemají nikdy tyto toxické efekty. Příroda sama odhalila, že řešením bude vložení vitamínu A do mléka formou mikro - emulgace.

Následně výzkumníci přistoupili k přípravě různých variací emulgované koncentrace až vytvořily jejich známou vysokou koncentraci A - mulsin. Její jedna kapka obsahuje 15 000 jednotek. Takto bylo možné podávat více než milion jednotek denně v postupných dávkách bez účinku na toxicitu jater. Vysvětlení je takové, že vitamin A v jeho emulgované formě je absorbován přímo lymfatickým systémem bez procházení játry ve vysokém množství. Vyřešením problému toxicity bylo možné následně testovat účinky tohoto produktu v různých dávkách.

Ukázalo se, že vitamin A má následující efekty:

1. v normální dávce..... chrání epitel (výstelku) a vidění
2. v dávce od 100 000 do 300 000 jednotek denně..... funguje jako silný stimulant imunity
3. v dávce od 500 000 do 1 000 000 jednotek denně..... funguje jako silná protinádorová látka, speciálně při kožních a přechodných karcinomech.

Žraločí chrupavka (Shark Cartilage)

Říká se, že žralok je nejzdravějším tvorem na zemi. Žraloci jsou imunní prakticky vůči všem známým chorobám lidí. Mnoho vědců věří, že žraločí skelet složený výhradně z chrupavky je to, co je zodpovědné za jeho neuvěřitelnou odolnost vůči chorobám.

Podle Dr. Contrerese, který podával žraločí chrupavku pacientům s rakovinou, byly shrnuty tyto její účinky:

Zpomalení růstu cév a tím způsobené zamezení vitality rakovinných nádorů, stimulace produkce protilátek a povzbuzení imunitního systému. Žraločí chrupavka jako netoxický produkt je kromě léčení rakoviny také vhodná na zánětlivá onemocnění jako je revmatismus nebo osteoartritida. Podle zkušeností se tumory často zmenšují v době od jednoho do tří měsíců od začátku podávání metabolické terapie. Je to také díky účinnosti vitamínu B17. Detailnější informace o žraločí chrupavce se můžete dočíst v knihách: *Jaws of Life* od dr. Alex Duarte a *Sharks Don't Get Cancer* od autora dr. William Lane. Nedoporučuje se však pro těhotné a kojící ženy. (viz také článek od Dr.. Contrerese na <http://www.worldwithoutcancer.org.uk>).

Meruňkové jádérka

Meruňková jádérka jsou levným, bohatým a přírodním zdrojem vitamínu B17. Také dodávají vitamíny, minerály a enzymy, které nenajdete v tabletové formě vit. B17.

- 10 jáderek denně je doporučených dr. Krebsem pro ty, kteří uplatňují prevenci proti rakovině
- 30-35 jáderek denně pro lidi trpící rakovinou.

V menšině případů mohou mít pacienti problémy s nevolností při užívání jáderek. V těchto případech se doporučuje snížit dávku a po odeznění problémů, postupně dávku zvyšovat. Ne všechna meruňková jádérka jsou však efektivní. Efektivní jsou ty s charakteristickou hořkou chutí, která indikuje přítomnost vitamínu B17. Některá meruňková jádérka jako např. ty pod názvem: "Hunza" v obchodech s výživovými produkty se ukázaly, že neobsahují vitamin B17. Jádérka se nejedí s peckou. Mají být vyloupaná, tedy zbavená pecky.

Poznámka: Někteří pacienti se domnívají, že konzumace samotných meruňkových jáderek je vše, co je nezbytné pro boj s rakovinou. Doporučuje se konzultace se specialistou na výživu, který dodá další informace. Meruňková jádérka jsou obvykle částí metabolické léčby tak jako pro lidi v prevenci, tak i pro pacienty trpící rakovinou (viz Fáze I., II.)

Vitamin B15 (Kyselina pangamová)

Vitamín B15 byl objeven stejně jako vitamin B17 dr. E.T. Krebsem, Jr. v r.1952 když zkoumal chemické složení meruňkových jadérek. Mohli bychom říci, že to byl neočekávaný bonus nebo vedlejší produkt výzkumu vitamínu B17. *“Nejlepší cesta pochopení účinku vitamínu B15 je považovat ho za neodkladný kyslík“* říká dr. Krebs. *“Zvyšuje kyslíkovou účinnost celého těla a pomáhá v detoxikaci zplodin těla. Poté, co se rakovinné buňky za přítomnosti kyslíku nerozvíjejí, závisí na kvašení glukózy, a toto je to, co dělá vitamín B17 nepřímo nepřítelem rakoviny“.*

V roce 1965 Akademie výzkumu SSSR (tehdejšího Ruska) zveřejnila 205 stranové sympozium o jejich objevech. V roce 1968 Vědecký poradní výbor Ministerstva zdravotnictví jednomyslně ratifikoval všechny původní prohlášení v písemné zprávě a pověřil Sovětský průmysl léčiv začít masovou produkci vitamínu B15 na jeho všeobecné užívání. Informovali, že ruští atleti požívali vysoké dávky vitamínu B15 během účasti na olympiádě. Pokud to je pravda, existuje proto dobrý důvod. Experimenty ukázaly, že tato substance ačkoli je jen přírodní stravovací faktor, vysoce zvýšila sílu a výdrž. Když potkany vložily do kádě s vodou a byly nuceny plavat, tak ti, kterým byl podán vitamin B15, ještě dlouho potom plavali, ti ostatní byli utopení. Když zavřeli jiné potkany do skleněného vězení, ze kterého byl postupně odsáván kyslík, tak ti potkani, kterým byl podán vitamin B15 žili při nižší úrovni kyslíku déle než kontrolní skupina potkanů.

Sovětská vědci odhalili, že vitamin B15 je efektivní a účinný při problémech cirkulace krve, srdečních stavech, zvýšeném krevním cholesterolu, chorob kůže, ztvrdlých arteriích, průduškového astmatu, cukrovce a léčení zranění. Vědci byli speciálně hrdí na jejich objev, že B15 byl účinný ve zpomalení stárnutí! Profesor Shpirt z Městské nemocnice č.60 v Moskvě to zhodnotil takto: *“Věřím, že přijde čas, kdy vitamín B15 bude stát vedle slánky na stole každé domácnosti s jejím členům nad 40 let.“*

Pro detailnější analýzu tohoto objevu viz“Vitamin B15 (Pangamic Acid) ; Properties, Functions, and Use. (Moscow: Science Publishing House, 1965 přeloženo a vytištěno McNaughton Nadací, Sausalito, Calif.

Vitamin C (Esterovaný)

Nízký příjem vitamínu C může být spojen s vysokým rizikem rakoviny, srdečních onemocnění a makulární degenerací očí starších lidí. Toto jsou daleko více závažnější onemocnění než kurděje, první známá smrtelná nemoc z nedostatku vitamínu C. Ester - C je látka, která byla přizpůsobena tak, aby posílila imunitní systém tak dobře, aby fungovala jako antioxidant a detoxikant. 99,9 % všech zvířat na světě si dokáže vyprodukovat svůj vlastní vitamin C ve formě minerálního askorbátu. Bohužel lidé jsou v nevýhodě genetického nedostatku, hypoaskorbemie, neschopnost produkovat vitamin C ve vlastním těle. Jen pár živočišných druhů má tento samý problém: Guinejská prasátka, opice, lidoopi a jeden druh netopýra. Toto může do velké míry vysvětlit proč lidé nežijí tak dlouho jak by mohli. Pes dospívá (stává se zralým jedincem) ve věku 2 let a dožívá s přinejmenším 7 - násobku jeho dospívání, resp. 14 let. Člověk dospívá v 20-25 letech. Sedmkrát 20 rovná se 140 let, což by mělo naznačovat náš potenciální věk dožití, pokud bychom byli schopni produkovat vitamin C v našem těle.

Navíc, v nově vydaném článku publikovaném metabolickými lékaři dr. Ernest Krebs, Jr., Dr.. Dean Burk (USA), Dr.. Hans Nieper z Německa, Dr.. Ernesto Contreras z Mexika, Dr.. Manuel Navarro z

Filipín, a dr. Shigeaki Sakai z Japonska, kteří dospěli k závěru, že bez dostatečného množství vitamínu C, by se v těle člověka nic nevyléčilo.

Ester C je unikátní forma zprostředkovaného vitamínu C s metabolity. Metabolity jsou látky pocházející z výživných látek, které si tělo běžně vyrábí samo. Výzkum prokázal, že kombinace ne kyselého vitamínu C s metabolity je dobře absorbována a uchovávána v krevních buňkách a tkáni. Ester C je navíc vylepšen o synergickou směs flavonoidů, rutin, Acerolu a růžových šípků.

Unikátní, přirozený proces vyvolaný patentovanou novou formou vitamínu C je šetrný k žaludku, nekyselinotvorný, s neutrálním Ph. Jediná forma vitamínu C obsahující přirozené metabolity zdokonalující bioschopnost vitamínu C.

Active Hexose Correlated Compound (AHCC ®)

AHCC (Active Hexose Correlated Compound) je extrakt z mixu různých druhů hub rostoucích v tekutém prostředí. AHCC obsahuje v přírodě volně se vyskytující prospěšné ingredience nazývané oligosacharidy (alfa - 1 - 4 - glukán), aktivovanou hemicelulózu, aminokyseliny a glykoproteiny.

Klinické testy ukázaly, že AHCC může být příznivý doplněk tradiční protinádorové léčby. AHCC dokázal pomoci zvýšit celkovou účinnost, zlepšit celkovou kvalitu života a zároveň snížit mnoho častých vedlejších účinků. Podle výzkumníků z Hokaido, Kyorin a Teiko univerzity v Japonsku, AHCC vytváří silnější imunitní odpověď v těle. Konstatovali, že AHCC zvyšuje produkci NK buněk, zabíjí T - buněk a vyvolává produkci cytokinů. Také konstatovali, že AHCC pomáhá navodit hladiny Interferon - Gamma, IL - 12, IL - 2, a TNF - Alfa a potlačuje IAP a TGF - beta. Výzkum je však stále ve vývoji zjištění přesného fungování.

O AHCC se začali zajímat i v Severní Americe. V nemocnici OASIS OF HOPE v Mexiku nedávno provedli studii s příznivými výsledky. Univerzita v Kalifornii nedávno provedla 6měsíční studii, během níž podávali AHCC pacientům s rakovinou prostaty v množství 9 gramů denně. Jihozápadní univerzita přírodní medicíny nedávno zahájila 6 - měsíční experiment s pacienty trpícími HIV / AIDS. Kromě těchto dvou oficiálních klinických experimentů, množství dalších lékařů a mnoho významných výzkumných ústavů zahrnujících i Kolumbijskou univerzitu, pracuje s AHCC na každodenní bázi. V současnosti probíhají klinické studie s užíváním AHCC u AIDS a HIV pacientů.

Vitamin E (d - alpha tocopheryl acetate)

Vitamin E je silný antioxidant, který chrání buněčné membrány tak jako i další části, je rozpustný v tucích. Dr.Philip Binzel popsal jeho terapeutické využití s vitamínem B17 v jeho knize *Alive And Well* Dr.Krebs ve své knize *The Physicians Handbook Of Vitamin B17 Therapy* popsal vitamín E následovně: *“Vitamin E může zvýšit antioxidantní účinek vitamínu C a pomoci v uchování kyslíku v tkáních. Pacienti se zvýšeným krevním tlakem by měli začít jeho užívání nejprve v jeho menším množství a postupně zvyšovat množství dávky s upravením krevního tlaku. * Dávka množství by se měla podávat od 300 do 2400 IU denně.“*

* Catalonia, et al. Medical World News, 6/23/72, pg 82M

Preven - CA ® Antioxidant Formula

Preven - CA ® je přírodní zdroj důležitých živin, které obsahují silné antioxidanty a další složky s významnou ochrannou a preventivní hodnotou. Antioxidanty neutralizují buněčné defekty způsobené volnými radikály pocházejícími ze stravy s vysokým obsahem tuků, kouření, smogu, alkoholu, ultrafialového záření a množství dalších činitelů vygenerovaných z našeho současného moderního životního stylu. Mnoho pacientů s rakovinou užívalo tento preparát jako pomoc v jejich léčení a v současnosti je velmi široce užíván v USA, Japonsku a Mexiku.

Preven - CA ® je kombinace žraločích chrupavky a léčivých bylin. Které obsahují množství esenciálních aminokyselin. Tento přípravek byl vyformulovaný lékaři z nemocnice OASIS OF HOPE na zastavení růstu nádorů, poskytnutí antioxidantů na detoxikaci těla, posílení imunitního systému a poskytnout tělu důležité živiny pro zajištění doplnění každodenních živin pro pacienta.

Preven - ca je přírodní výživa na prevenci, která obsahuje následující složky:

Cardus Marianus: Také známý jako mléčný extrakt z bodláku, chrání buňky jater a to blokováním vstupu škodlivých toxinů do buněk a také pomáhá odstranit tyto toxiny z jaterních buněk. Spolu s dalšími bioflavonoidy je Cardus Marianus velmi silný antioxidant. Také regeneruje postižené buňky v játrech. Obecně je nejvíce doporučen na snížení škodlivých účinků alkoholu v játrech. Tato látka nemá žádné vedlejší účinky.

GRAPE SEED EXTRACT (extrakt z hroznových pecek): Hlavními úkoly proantokyanidů nalezených v hroznových peckách, je detoxikační činnost, stabilizace kolagenu a elastinu údržba - 2 což jsou zásadní proteiny ve spojovací tkáni, cévách a svalech.

CARROT ROOT (kořen mrkve): působí jako antioxidant a posiluje imunitní systém.

VITAMINY: A (20,000 IU), vitamíny B1, B2, B3, B5, C, E a vitamin- K.

MINERÁLY: sodík, vápník, hořčík, draslík, zinek, železo, magnézium a měď

MNOŽSTVÍ PROTEINŮ A AMINOKYSELINŮ.

SHARK CARTILAGE (žraločích chrupavka) (viz informace o žraločích chrupavce, str. 23).

ČESNEK: Česnek byl zmiňován již v Bibli a Talmudu. Hippokrates, Galen, Pliny the Elder a Dioscorides, všichni tito se zmiňovali o použití česneku na množství obtíží nevyjímaje parazity, problémy s dýcháním, špatné trávení a deficit energie. Jeho použití v Číně bylo zmíněno již v roce 510 našeho letopočtu. Luis Pasteur potvrzuje jeho protibakteriální účinky v roce 1858. Studie na lidech prokázaly, že pravidelné požívání česneku snižuje riziko jícnové, žaludeční rakoviny a rakoviny tlustého střeva. A to díky jeho schopnosti redukovat rozvoj karcinogenních shluků. Na zvířatech v laboratorních podmínkách bylo otestováno, že česnek s jeho sirnou složkou zastavuje nárůst různých druhů rakoviny, speciální rakovinu kůže a prsu.

ALFALFA: Je to rostlina s vydatnými živinami nezbytnými pro naši denní výživu. Je bohatá na proteiny, vitamín A, B1 (Thiamin), B2 (riboflavin), vitamin C, vitamin K, fosfor, kalcium, zinek, železo, magnézium, mangan a měď.

Bold: Vědci se domnívají, že Boldin je zodpovědné za procesy výroby žluči (žlučová stimulace) a diuretické procesy. Ve spojení s ostatními bylinami, jako jsou Cascara, reveň a hořec je boldo odpovědné za zlepšení symptomů spojených s nízkým apetitem.

Existuje názor, že 60 % všech degenerativních onemocnění je přímo spojených s faktem našeho denního stravování. Strava a výživa jsou pravděpodobně nejdůležitější faktory v prevenci degenerativních chorob. Preven - ca je přírodní produkt ve formě kapslí, které dodávají nejvíce živin jaké pravidelně potřebujeme a nejsou obsaženy v naší běžné stravě. Mnoho z těchto živin je nezbytných pro naše tělo aby pracovalo v rámci svých nejvyšších možností.

Daily Complete ® Liquid Multivitamin (Denní komplet, tekutý multivitamin)

Multi vitamín / minerál komplex obsahuje velké množství esenciálních živin. Hlavním významem produktu je poskytnout pacientovi pohodlnou cestou široký rozsah živin najednou v 1 tabletě, aby zajistilo vyrovnání případného deficitu vitaminů a minerálů v těle a také zajistilo vysoký příjem výživy ve snaze dosáhnout dostatečného množství nad úroveň typicky stanovené stravovacího hranice. Oba doktoři dr. Philip Binzel a dr. E. Contreras používají tento preparát vždy jako součást jejich léčby rakoviny.

Daily Complete ® je 100% rostlinný extrakt v tekuté formě.

Barley Grass (Just Barley ® Juice) - Mladý ječmen

Léčba mladým ječmenem spočívá hlavně v detoxikaci a konzumaci nápoje z mladého ječmene několikrát denně. Čerstvý mladý ječmen v této formě je silný zdroj množství vitaminů, minerálů a rostlinných enzymů. Dalo by se říci, že je to vlastní výživový program přírody. Stébla pšenice a stébla ječmene také obsahují vitamín B17, ačkoli zdroje jako meruňková jádérka jsou silnější.

Just Barley ® Juice je prášková forma čisté přírodní šťávy z mladého ječmene (mladých ječných listů). Poskytuje nejširší spektrum výživy, jaká se nachází v přírodě a je dostupná z jediného zdroje na světě. Jen samotný ječmen obsahuje nejméně 16 vitaminů, 23 minerálů, 8 aminokyselin a množství využitelných enzymů. Ječmen má jeden z nejvíce zásaditých PH faktorů z dostupné potravy a obsahuje velké množství přírodního chlorofylu. Dr. Conreras používá tento preparát jako součást rakovinové léčby.

Just Barley ® je pěstován z vybraných ekologicky čistých semen na půdě o rozloze více než 1525 m2 bohaté na minerály na místě bývalého vulkanického jezera. Zavlažuje se čistou pramenitou vodou a sklízí se na vrcholu jeho výživné hodnoty. Zpracovává se pod přísným dohledem, je zbavován vody při teplotě 471 stupně Celsia (880F) z důvodu důležitého zachování účinnosti živin.

Just Barley Green garantuje jeho přírodní ryzost a 100 % ekologickou čistotu pěstování. Garantuje také jeho 100% čistý extrakt šťávy bez doplnění jiných sloučením, sladidel či přísad jakéhokoliv druhu.

Dodatkové metabolické doplňky (Běžně nepředepisované ale doporučené)

Maximol (Neways International)

Obrovský nárůst výskytu rakoviny a jiných degenerativních onemocnění je především z důvodu vyčerpaného obsahu vitamínů / minerálů v dnešní západní stravě spolu s environmentálními / chemickými faktory. Počet klíčových nutričních složek, které chybí pacientům s rakovinou je 817 a stopový prvek selen. Nedávná Americká studie ukázala celkový pokles úmrtí na rakovinu o 50% a pokles o 37% u nových případů rakoviny, zejména plic, tlustého střeva a prostaty, mezi 1300 dobrovolníky užívajícími doplňky čtyři roky*.

Minerální doplňky jsou nejúčinnější v ionizované "kapalně suspenzní" formě, ve spolupráci s fulvokyselinami, kde se očekává 98 % asimilace v těle, oproti 48 % u chelátových minerálů a 10-12 % u kovů. Naše těla používají minerály jako surovinu. Tělo je nemůže vyrobit, a tak musí být přítomen v potravinách. Bohužel, jak již bylo uvedeno dříve, náš potravinový řetězec je velmi chudý na minerály což má za následek více než 150 chorob z nutričního deficitu, kterými je naše společnost sužována s rostoucí intenzitou.

Chcete-li bojovat proti této velmi reálné hrozbě, minerální a vitamínový doplněk, je nezbytný pro každého a může doslova znamenat rozdíl mezi životem a smrtí, a to zejména pro ty, s rakovinou. Chcete-li bojovat proti této hrozbě, Neways vyprodukoval Maximol, pravděpodobně nejvíce komplexní kapalně doplněk stravy, který obsahuje 67 základních a stopových prvků, 17 zásadních vitamínů, 21 aminokyselin, tři enzymy, a Lactobacillus acidophilus . Pro zajištění větší absorpce všech těchto složek byl Maximol formulován s přírodními cheláty, používané rostlinami a zvířaty pro vstřebávání minerálů a živin - organické fulvokyseliny. Je známo, že fulvokyseliny pomáhají dopravovat asimilovat minerály a živiny do živých buněk. To může být částečně způsobeno jeho nízkou molekulovou hmotností, jeho elektrickým potenciálem a jeho bio-přepravní schopností. Fulvokyselina pomáhá při selektivní výměně nebo dodávce minerálů a dalších živin uvnitř buněk. Fulvokyselina je účinná při neutralizaci široké škály toxických látek - od těžkých kovů a radioaktivních odpadů až po ropné látky. Předtím, než mohou být minerální látky použity, musí být nejprve převedeny z jejich koloidního stavu na mikro - koloidní stav. Pro větší biologickou dostupnost, Neways vyvinul Maximol Solutions jako organickou kyselinu fulvic komplexu mikro - koloidní roztok. V této podobě, Maximol poskytuje vyšší procenta snadno asimilovatelných minerálů než ne - ionizovaných koloidní minerálních doplňků, jejichž částice jsou často příliš velké pro snadné vstřebávání.

* Daily Mail , 28.července 1999 , s. 31.

Revenol (Neways International)

Vědci nám říkají, že vitaminy A, C a E, stejně jako beta- karoten a jiné antioxidantní bioflavonoidy, jsou životně důležité pro dobré zdraví. Antioxidanty mají asi 20 krát větší sílu než vitamín C a 50 krát větší než vitamín E. Neways produkt Revenol obsahuje antioxidanty, které jsou širokospektrální. Revenol obsahuje antioxidanty z přímořské borové kůry a hroznových jader, pyknogenolové výtažky - až v 95 % koncentraci a bioavailabilitě . Revenol také obsahuje kurkuminoidy - přírodní nejsilnější a agresivní antioxidant, který je asi 150 krát silnější než vitamín E, asi 60 krát více silnější než vitamín

C , a asi 3 krát silnější než antioxidant z přímořské borové kůry a hroznových jader pyknogenolový extrakt1 *.

** Majeed , Muhammed , Ph.D. et al kurkuminoidy - Antioxidant Phytonutrients , Nutriscience Publishers , 121 Ethel Road West , jednotka 6., Piscataway , NJ 08854 USA*

Revenol také obsahuje ginkgo-bilobu pro mozek a oběhový systém; alfa a beta karoten na zvýšení účinnosti; ester Vitamínu C - složená forma vitamínu C, který zvyšuje jeho výkon a udržuje se v těle až 3 dny, přírodní vitamin E pro lepší absorpci a účinnost. Mikrosféry působí na střevní stěnu, umožňují že až 400 % složek může být tráveno a absorbováno. Jedna tableta Revenol dodává více než 60 miligramů kurkuminoidů a přímořské borovicové kůry a extraktu z hroznových semen. Nezávislá studie na antioxidanty, byla provedena ruskými biochemiky. Když oznámili svá zjištění Světové zdravotnické organizaci, očekávalo se že Reveno bude uveden jako světové Nr. 1 antioxidant.

Kaskádový Revenol

Neways také vydal novější verzi Revenolu, s názvem Cascading Revenol. Volné radikály, nepárové molekuly kyslíku, které odbourávají kyslík, poškozují zdravé buňky a jsou obzvláště nebezpečné pro nemocné rakovinou. Antioxidanty, jako je vitamin C, neutralizují poškození způsobená těmito volnými radikály. Problém je v tom, že poté, co vstoupí do těla, nejvíce antioxidantů se naváže na jeden volný radikál a pak přejde do inertního stavu a přestane fungovat. Další problém je, že i když antioxidant neutralizuje volný radikál, proces vytváří odnož volného radikálu, který se mírně liší a na ten je méně účinný, což vytváří další, a tak dále. Typické antioxidanty nemají schopnost řešit tento kaskádový efekt volných radikálů. Nicméně technologicky vyspělé složení kaskádového Revenolu regeneruje tyto molekuly a zabraňuje kaskádovému efektu, místo toho, aby zničen pouze jeden volný radikál, každá molekula je schopna změnit strukturu a postup opakujte znovu a znovu. Tento produkt je nezbytnou součástí jakékoliv léčby B17 a Metabolické terapie.

Cassie - Tea (Neways International)

Cassie - Čaj je tradiční zdravotní formule navržena tak, aby pomohla tělu eliminovat toxiny, které se hromadí v těle s věkem. Turecký kořen reveně podporuje játra a střevní mikroflóru, zatímco šťovík a kořen lopuchu pomáhá v tělu v úsilí udržet zdraví krevního oběhu. Jilm pomáhá zklidňovat podrážděné sliznice a zklidňuje a navlhčuje dýchací cesty. Neways "Cassie – Čaj“ je stejný jako slavný Essiac . René Caisse , kanadská zdravotní sestra, léčila tisíce pacientů s rakovinou již šedesát let s použitím bylinný nápoj oblíbeného u Odživejských indiánů. V 1937 Královská komise pro rakovinu Kanady provedla slyšení týkající Essiacu ("Caisse" pozpátku) se závěrem, že přípravek byl označen jako účinný v boji proti rakovině. Tom Mower, prezident Neways , získal formuly pro Cassie - čaj ze zdroje, míchá čaj pro zdravotní sestru Caisse. Cassie - Čaj je vynikající doplněk stravy pro ty, kteří procházejí B17 a metabolickou terapií.

Hawaiian Noni Juice (Neways International)

Ovocné šťávy z *Morinda citrifolia* obsahuje na polysacharidy bohaté látka s výrazným protinádorovým účinkem, podle nedávných studií „do známého ovoce *“. Tento výzkum, provádí na univerzitě v Havaii, má za následek nové vzrušující a vědecky seriózní důkazy o možných výhodách Noni ovocné šťávy při léčbě rakoviny. Neways Authentic Hawaiian Noni nabízí všechny zdraví upevňující výhody rostliny Noni, stejně jako malinové a borůvkové extrakty - silné antioxidanty.

** Hirazumi ,a Eiichi Furusawa , "Imunomodulační polysacharid- Rich Látka z ovocné šťávy Morinda citrifolia (Noni) s protinádorovou aktivitu " , katedra farmakologie , John A Burns School of Medicine , Havaj , HI 96822 USA*

Purge , Feelin Good (Neways International)

Výzkumní pracovníci uvádějí, že většina lidí, zejména těch s rakovinou, hostí jednoho či více parazitů. Paraziti jsou formy života, které jsou nezvanými nájemníky v našem těle, kteří neplatí nájemné. Může jít o malé améby detekovatelné pouze s mikroskopem ale i o tasemnice, několik metrů dlouhé. Parazity obvykle získáme běžnou denní aktivitou, a to zejména prostřednictvím jídla nedostatečně tepelně upraveného nebo kontaminovanou potravinou. Krevní motolice například může získat z infikovaných pitné vody a usazuje se v močovém měchýři, střevech, játrech, plicích, konečníku a slezině, kladou vajíčka a vyvíjejí se v člověku i 20 let. Svalovec, stočený červ. Larvy nalezneme v nedostatečně tepelně upraveném vepřovém. Sťahují se ze střev prostřednictvím krve a lymfatického systému nakonec se usídlí ve svalech. Larvy vlasovce pronikají do kůže z půdy a procházejí krevním řečištěm do plic, což může způsobit pneumonii . Odstranění parazitů má v podstatě tři fáze. Zabít, dostat ven těla a doplnit do těla živiny pro udržení optimálního zdraví . Neways nabízí tento velmi účinný třífázový program využívající své výrobky Purge , Feelin ' Good a Maximol řešení k očistě a zabránuje opětovnému napadení.

Di - methyl - sulf - oxide (DMSO)

DMSO je vedlejším přírodním produktem dřevařského a papírenského průmyslu a získal si přední místo vysoce účinné látky v metabolické terapii při léčení rakovin, herpesu a jiných nemocí. Je oblíbený kvůli své silné vstřebatelnosti přes buňky a biologické bariéry v těle a tak stimuluje buněčné procesy. Dr. Morton Walker ve své knize "DMSO: The New Healing Power" (DMSO: nová léčící síla) popisuje, jak tato látka blokuje bolest, snižuje záněty, ničí bakterie a plísňe, snižuje srážlivost krve, posiluje cirkulaci, neutralizuje volné radikály, stimuluje imunitu a podporuje hojení ran. Používá se k mnoha účelům, od malých poranění, přes opary, štípnutí hmyzem, po sportovní úrazy, artritidu a rakovinu.

DMSO je známý pro své schopnosti penetrovat krevní / mozkovou bariéru a používá se (míchá se) spolu s intravenózní formou B17 na to, aby se tento snadno dostal k těžko přístupnému tkáni. DMSO je schopno proniknout tkáni rapidně a kompletně (Pokud například kápnete par kapek na čisté zápěstí, za pár minut můžete pocítit v ústech česnekovou chuť charakteristickou pro DMSO). Mnohé kliniky ho používají při léčení všech druhů rakovin, ale někteří lékaři upřednostňují nepoužít ho při onemocněných jater a ledvin.

Intravenózní aplikace: 3 ml až 5 ml DMSO na 10ml vitamínu B17 v 30 ml stříkačce. Např. Každá 10 ml ampule obsahuje 3 gramy vitamínu B17. Dvě 3 - gramové ampulky se rozmíchají se 6 až 10 ml DMSO v 30 ml (30 - Kubíková) stříkačce.

Externí použití: Lékaři míchají 42 ml DMSO s 18 ml injekční vody ve skleněném poháru (nesmí být z plastu !) ; Použijí přírodní (bavlněnou, NE syntetickými!) vatu, se roztok nanese na postižená místa 2 až 3 - krát denně. Postižené místo se po 10 minutách opláchne.

U obou forem podávání může pacient cítit česnek a mít stejnou chuť v ústech. Není to nic zvláštního.

Při rakovinách kůže se může DMSO mísit s vitamínem C (čistým, v prášku) a nanášet na postižená místa. Rovněž lze využít i samotný vitamín C bez DMSO.

Přehled B17 metabolické léčby

Prosím, berte na vědomí: Následující informace jsou sestaveny podle léčebných postupů klinik po celém světě, které jsou zaměřeny na léčbu rakoviny. Tyto postupy jsou na poli alternativní léčby rakoviny obecně uznány jako nejvíce efektivní v boji s rakovinou i jako prevence lidí a zvířat. Je na čtenáři, aby se svobodně rozhodl a prohodil následnou léčbu rakoviny s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem, v případě, když se pro ni rozhodne.

Ernst T. Krebs Jr.

"Pokud máte rakovinu, nejdůležitějším faktorem je dostat do těla maximální množství vitamínu B17, v co nejkratším čase. Faktor zdravotnické zkušenosti podávání B17 je až druhořadým, protože je relativně minimální."

Dr. Harold W. Manner

„Metabolická terapie je prostě použití přírodních stravovacích produktů a minerálů pro prevenci a léčení rakoviny a to vybudováním silného imunitního systému. Klíč k zastavení růstu rakoviny neleží v tradičním léčení rakoviny, jako je chemoterapie, radioterapie a chirurgický zákrok, ale na principu, že je třeba pracovat s tělem a ne proti němu“

„Tělo se čistí od nepřírodních látek detoxikací, vitamíny se podávají na stavbu imunitního systému, enzymy rozbíjejí proteinové obaly kolem rakovinných buněk, které je chrání před imunitním systémem. Rovněž se zvyšuje činnost žláz v těle. Vitamin B17 a vitamin A spolupracují s enzymy a imunitním systémem a ničí rakovinné buňky.“

"Zpočátku se Laetril jevil jako neúčinný, což také je, pokud je používán samostatně, izolovaně. V metabolické léčbě funguje spolu s enzymy a vitamíny a imunitním systémem zničí již oslabenou rakovinu.“

Metabolická léčba je schválena mnoha doktory včetně doktorů Emestem a Franciscem Contreras, dvou světově nejznámějších a úspěšných lékařů na rakovinu. Contrerasov tým zkoumal více než 75 různých terapií více než 34 let a vyléčil přes 100,000 pacientů. Tým pokračuje ve snaze najít tu nejpokrokovější, nejefektivnější léčbu na světě.

Protokoly metabolické léčby B17

Fáze I. - Prvních 21 dnů

Počáteční fáze sestává z 21 - ti denní léčby, během níž se na klinikách používá intravenózní forma B17, často kombinovaná s tkáň - pronikajícím činidlem DMSO a vysokou dávkou vitamínu C. Pokud není možné zrealizovat intravenózní podání B17, nahrazuje se 500 mg tabletami B17 spolu s meruňkovými jádry, které se dají snadno aplikovat v domácím léčení. Doplněková léčba zahrnuje hlavně pankreatické enzymy, vitamin C, antioxidanty, emulgovaný vitamin A & E. Velmi nápomocné jsou i mladý ječmen - prášek, žraločí chrupavka, multivitamíny, vitamin B15, AHCC a dostupné celé ovoce, které obsahuje vitamin B17 (např. meruňková jádérka). Detoxikace a kompletní výživový doplnkový proces jsou přesně popsány v následujícím textu.

Fáze II. - Následující 3 měsíce

Druhá fáze sestává z tablet vitamínu B17, meruňkových jáderek, enzymů, vitamínu C, EMULGOVANÉ vitamínu A & E, žraločí chrupavky a pokračující detoxikace a výživové procedury zahájené ve fázi I.

Co je metabolická terapie?

Fáze I., metabolický balík na prvních 21 dní

Ve dvou alternativách:

Intravenózně (dávky doporučené doktorem Ernesto a Francisco Contreras z Oasis of Hope Hospital)

S injekčními ampulemi B17/Amygdalin na podání kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Tento balíček obsahuje:

- Vitamin B17 ampule: Obsah dvou ampulí podat najednou, pomalým aplikováním intravenózně (IV) přímo do žíly nebo katétru, jednou denně (20ml stříkačka / 21 ryska x 1 ½ inch jehla) (ekvivalent 1,5 inch = 3,8 cm).
- Vitamin B15 (pangamic acid): jedna tobolka třikrát denně po jídle.
- Prevent - ca capsules (bohaté na antioxidanty a byliny): jedna tobolka s každým jídlem.
- Megazyme Forte enzyme tablety: tři tablety 2 hodiny po každém jídle (9 denně).
- Ester C 1000mg (Vitamin C) tablety: jedna tobolka s každým jídlem.
- Vitamin A & E emulzní kapky: 5 kapek s džusem nebo vodou třikrát denně.

- Mladý ječmen - šťáva (Just Barley Green Juice): jedna čajová lžička v džusu třikrát denně.
- Žraločí chrupavka: 3 kapsle s každým jídlem (9 denně).
- Vitamin E: jednu žele kapsli s obědem a jednu s večeří. (2 denně)
- AHCC 1000mg (Active Hexose Correlated Compound): jedna kapsle s každým jídlem.
- Daily Complete liquid multivitamin Nutrient: 1 oz (dvě polévkové lžíce) jednou denně s jídlem
- Meruňkové jádérka: Jedno meruňkové jádérko na 4,5 kg tělesné váhy. Ne více než 6 za hodinu nebo 30-35 za den. (pokud vážíte 60 kg.... 13,5 jádérka)

Tento protokol nezahrnuje DMSO (dimethyl sulfoxide) pro intravenózní podávání vitamínu B17. Někteří lékaři však používají tento přípravek k dosažení maximálního proniknutí B17.

nebo

orálně

Injekční formu nahradí 500mg tablety amygdalinu. Dr. Contreras doporučuje 2 tablety s každým jídlem, celkově 6 za den. Jinak orální fáze obsahuje totéž, co je uvedeno výše. Můžete si ji pořídit pro pohodlné užívání doma.

- Vitamin B17 500 mg tablety: 2 tablety třikrát denně s jídlem (6 denně). Toto je nepohodlnější a nejméně používaná metoda aplikování amygdalinu. Obsah tablety je 500 mg.

Pokud máte potíže s polykáním, tablety mohou rozdrtit a přidat do měkkého jídla. Pokud máte problémy se žaludkem rozdělte si dávkování po jedné tabletě 6x denně. Pokud pociťujete nevolnost užívejte půl tablety každou denní (během dne) hodinu. Je dobré mít v žaludku nějaké jídlo před užitím.

- Vitamin B15 (pangamic acid): jedna tobolka třikrát denně po jídle.
- Prevent - ca capsules (bohaté na antioxidanty a byliny): jedna tobolka s každým jídlem.
- Megazyme Forte enzyme tablety: tři tablety 2 hodiny po každém jídle (9 denně).
- Ester C 1000mg (Vitamin C) tablety: jedna tobolka s každým jídlem.
- Vitamin A & E elulované kapky: 5 kapek s džusem nebo vodou třikrát denně.
- Mladý ječmen (Just Barley Green Juice): jedna čajová lžička v džusu třikrát denně.
- Žraločí chrupavka: 3 kapsle s každým jídlem (9 denně).
- Vitamin E: jednu želovú kapsli s obědem a jednu s večeří.
- AHCC 1000mg (Active Hexose Correlated Compound): jedna kapsle s každým jídlem.
- Daily Complete liquid multivitamin Nutrient: 2 polévkové lžíce jednou denně s jídlem.

- Meruňkové jádérka: Jedno meruňkové jádérko na 4,5 kg tělesné váhy. Ne více než 6 za hodinu nebo 30-35 za den. (pokud vážíte 60 kg.... 13,5 jádérka).

Po prvních 21 dnech následuje.... Fáze II., **Na další 3 měsíce**

Balíček obsahuje B17 v 500mg tabletách s ostatními doplňky jako ve fázi I s výjimkou dávkování vitamínu B17 a A & E Emulsion kapek, které se mění následovně:

- Vitamin B17 500 mg tablety: 1 tableta s každým jídlem a jedna před spaním. (celkem 4 denně)
- Vitamin A & E emulsion kapky: 10 kapek v džusu nebo vodě dvakrát denně.

Udržovací dávkování

Převzato z knihy *Physician's Handbook of Vitamin B17 Therapy (lékařovou příručka B17 metabol léčby)*

Dr. Krebs doporučuje obecně celkovou dávku převyšující 300 gramů vitamínu B17 během léčebného procesu dostání rakoviny pod kontrolu (rozuměj remise, tj. vyléčení). Čas k dosažení maximální reakce se pohybuje od 4 měsíců až po více než rok. Pokud se dosáhne dobrá reakce během prvních tří týdnů, dávka může být snížena a upravená vhodně pro daného pacienta. Rakovina pod kontrolou je udržována ve vyrovnaném stavu užíváním 1 gramu (2 tablety 500mg) vitamínu B17 denně orálně (tablety). Přesto se někteří pacienti cítí bezpečněji užíváním 1,5 až 2 gramů vitamínu B17 denně (3-4 tablety 500mg). Odůvodnily to jejich lepším cítěním, získáním síly, zvýšením chutě do těla, nárůstem hmotnosti, psychologickým zlepšením s redukcí nervozity a úzkosti, s prokazatelným stupněm optimismu přibližujícím se normálu a zájmu o své okolí.

Abnormální situace, stres nebo nemocné zdraví člena rodiny či přítele se u některých pacientů ukázaly být spouštěči nástupu rakovinového procesu. Proto by si lékaři měli být vědomí těchto skutečností u pacientů, jejichž rakovina je pod kontrolou (vyléčených). Pokud byla rakovina úspěšně překonána a pod kontrolou přes 2 roky a pacienti prokazatelně dosáhli dobrého výsledku v přírůstku hmotnosti, zvýšením síly, návratu do normálních kolejí v aktivitě a vitalitě, mají negativní CGH test moči, zlepšení rentgenu, respektive přísl. objektivních vyšetření jako důkazu, pak dávka vitamínu B17 může být snížena na běžnou stravovací úroveň a to nejméně 1 tableta 500mg denně.

Běžné nastavení příslušenství léčby

Eliminace / odstranění

Často opakované chronické zácpy, může být faktor etiologie (věda o příčině vzniku nemocí) některých druhů rakoviny. Pro každý případ je vhodné vyhýbat se zácpě. Obecně se dá zácpám vyhnout projímadlem či zvýšením příjmu vlákniny.

Neexistují žádné kontraindikace při užívání vitamínu B17 a nebo pankreatických enzymů během radioterapie, chemoterapie či operačního zákroku.

Kombinované formy léčby

Všechny formy radiace mohou buď snížit o jeden stupeň, nebo zmenšit nerakovinný nádor stejně dobře jako rakovinný nádor. Mnoho chemoterapeutik je podobně schopných zmenšit nádory, zhoubné či nezahoubné. Bohužel však, jakéhokoliv zmenšení je dosaženo na úkor zničených somatických / tělních buněk, obzvláště základních / opravných buněk. Ačkoli množství nezahoubných nádorů je citlivých na ozařování, zatímco trofoblastická nádory vnějších zárodečných obalů zhoubných nádorů vycházejících z kožní výstelky (chorionepitelióm) a podobné vysoce zhoubné nerozlišené buňky jsou rádiodolné, radiace může zvýšit poměr rakovinných buněk v nádoru, úchvatným indexem zavádějícího otok a nespolehlivým kritériem protinádorového léčebného účinku.

Operační zákrok je ale často život zachraňující v případě rakoviny, a to nápravou blokády, opravou píštělí nápravou krvácení, rekonstrukčních plastických oprav a tak podobně.

Pokud je možné chirurgicky odstranit nádor kompletně, jako např. při raném nemetastázovém stádiu rakoviny dělohy, pak operace může zachránit zdraví a život pacienta. Vztahuje se rovněž na operace předrakovinových hyperplazií, polypů, papilon, kožních poškození, leukoplakií, senilní keratózy a pod. Pokud byla provedena rozumná operace, vitamin B17 a pankreatická léčba není kontraindikativní za žádných okolností, dokonce se doporučuje již před operací.

Jelikož plicní (plicní) nádory se jeví obzvláště reagující na užívání vitamínu B17 a proteolytické enzymy, tento přístup je preferovanou metodou léčby.

Neplatí to však pro rány či poškození na kůži či v tkáni, způsobených ozařováním nebo rádiometickými chemoterapeutiky.

Světlo

Výzkum účinků mnoha druhů a zdrojů světla prokázal, že umělé osvětlení zvyšuje tempo růstu nádorů u zvířat a také stimulaci stávajících rakovinových onemocnění u lidí. Pacienti by se měli vyhýbat dlouhodobému kontaktu s umělým osvětlením a pobývat co nejdelší dobu na denním slunečním světle bez brýlí.

Délka života u testovaných zvířat s nádory a očividně i u pacientů s nádory se výrazně zvyšuje využíváním plného spektra slunečního zdroje světla, nefiltrovaným sklem z okna, dioptrickými brýlemi, slunečními brýlemi a kontaktními čočkami. (Ultrafialové spektrum záření je významně prospěšné bez použití běžného skla nebo plastu jako filtru).

Hygiena

1. Nekouřit a nezdržovat se v místnostech s kuřáky
2. Nepít alkoholické nápoje a také sladké limonády.

3. Vyhýbejte se aplikaci trvalé ondulace (platí pro ženy a jejich účesů), toxickým vlasovým sprejem, syntetické kosmetice, rtěnky na rty s obsahem barviva z černouhelného dehtu a antiperspirantem.
4. TELEVIZE - co nejméně. Už i malé dávky ionizujícího záření způsobuje abnormální aktivitu v rostlinných a živočišných buňkách (a následně se výrazně snížená aktivita projevuje vyčerpaností). Opakované dávky záření, nezáleží, jak jsou malé, by se měli pacienti s rakovinou stranit. Nepoužívat mobilní telefony, mikrovlnky a bezdrátové spojení.
5. Doporučuje se dostatečný spánek, 8-9 hodin denně.
6. Zvyšte přívod kyslíku cvičením na volném vzduchu a za slunečního světla daleko od smogu a exhalátů z prostředí. Pokud jste na denním světle za slunečního počasí, sundejte si brýle a nepoužívejte ani sluneční brýle.
7. Měli byste se vyprazdňovat nejméně jednou denně (stolice).
8. Doporučujeme denně teplá lázeň na stimulaci cirkulace.

Stravování

Následující stravovací režim se běžně přísně dodržuje během prvních 3-4 měsíců léčby a následně se postupně zmírňuje po zlepšení stavu pacienta.

Stravování by mělo být založeno převážně na čerstvém ovoci a zelenině a jejich čerstvých šťávách. Produkty živočišného charakteru by měly být omezeny pouze na častou konzumaci čerstvých ryb a příležitostně drůbeže uvařené ve vodě bez použití soli a jakéhokoli oleje či masti. Opatrný je třeba být při výběru drůbeže, neměla by být krmena hormony a měla by být bez virových či bakteriálních infekcí. Pacient má mít na zřeteli následující stravovací program:

Rostlinné produkty:

Doporučené je každé jedlé ovoce a rostliny. Tyto by měly být konzumovány čerstvé a syrové v co největší možné míře. Některé z nich mohou být uvařené do té míry, aby byly použitelné k jídlu. Krátký a rozumný čas vaření na mírném ohni (tak jako to dělají v čínských restauracích) nezničí enzymy nacházející se v jídlu. Rostlinná strava nemá obsahovat žádné chemikálie, jako jsou postřiky, konzervační látky atd. Celá zrna jsou výhodnější než rafinovaná mouka. Všechna naklíčená zrna jsou dokonce nejvhodnější ke konzumaci.

Živočišné produkty:

Ryby a drůbež mohou být pečené, vařené, grilované (nikdy ne pražené) a připravené bez rafinované soli či živočišného tuku. Žádné jiné živočišné maso či výrobek nejsou dovoleny.

ČAJ A KÁVA bez jakéhokoliv sladidla či medu a také bez mléka může být konzumovány v rozumné míře, ale preferuje se jejich úplné vyloučení.

BYLINNÉ ČAJE mohou nahradit čaj a kávu. TABÁK je přísně ZAKÁZÁN. V průměru lidé za rok zkonzumují vlastní váhu cukru. SLADIDLA by se nikdy neměli přidávat do jídla. Je třeba vyhýbání se cukru a produktů obsahujících cukr.

Doporučené jsou rozumné vitaminové a minerální doplňování. Tyto doplňky musí obsahovat všechny vitamíny a všechny nutriční minerály.

Ačkoli ovocná a zeleninová strava by měla zajistit značné množství vlákniny či nestravitelné buničiny je doporučeno z mnoha důvodů zvýšit obsah vlákniny ve stravě a to dodáváním 2-4 polévkových lžic 100 % komplexní vlákniny denně. Toto může být podáváno v ovocné nebo zeleninové šťávě či vmixováním do jídla.

Pokud je pacient alergický na nějaké jídlo, měl by se ho stranit a jeho doplňování tekuté vlákniny by mělo být konzultováno a upravené odborníkem či poradcem na výživu.

Náš obecný biologický instinkt nás běžně nutí dožadovat se čerstvého, syrového a nevařeného ovoce či zeleniny, jakož i jejich šťáv k zajištění všech výživových cílů organismu, ale naléhavě v případě pokud trpíte rakovinou.

Shrnutí:

- Vyhýbat se jídlu, které je zamrazené či konzervované (plechovky také)
- Vyhýbat se jídlu obsahující konzervační látky, přísady nebo barviva.
- Nejíst produkty obsahující bílou mouku, sůl nebo bílý cukr.
- Vyhýbat se všem druhům červeného masa jak je jen možné. (Je to těžké, ale budete se cítit lépe). Vyhýbejte se mléčným výrobkům, hovězímu, skopovému, vepřovému, slanině, šunce, apod.
- Jezte hodně "žijícího jídla" jako je ovoce a zelenina a čerstvě vymačkané nápoje.
- Denně vypijte 6 - 8 sklenic vody (jako doplněk s jinými tekutinami). Pamatujte, že čistý zdroj vody je také důležitý
- Vyhýbejte se toxinům všeho druhu včetně tabáku, alkoholu, omezte kávu, sedativa, analgetika.
- Odpočinek je důležitý, zatímco cvičení by mělo uvolnit postiženou oblast.

ÚLOHA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ

Tělesný aspekt

Účinek pozitivního přístupu ve zvýšení imunologické tělesné odezvy při zdolávání choroby může být pozorován ve změně proteinového séra, produkce protilátek a celkovém obranném účinku organismu. Pacienti by měli vzít na vědomí, že jejich tělo potřebuje pomoc a stimulaci pozitivního přístupu a optimistického myšlení.

Pacientovo kooperativní úsilí v odpovědnosti za jeho stravování a hygienu, za užívání vitamínu B17, enzymů a dalších doplňků je NEZBYTNÉ, jako nejkompexnější možnost zvládnutí jeho rakoviny. Pokud je pacientův přístup negativní nebo nekooperativní s pokračováním užívání tabáku, cigaret, alkoholu, vystavování se prostředí karcinogenních zplodin, pacient by měl být přímo konfrontován. Negativní přístup by měl být absolutně odbourán. Negativismus vyskytující se u většiny pacientů s rakovinou před zahájením metabolické léčby je jedna z náprav, které se dosahují v průběhu léčby. Trvalý negativní přístup a neschopnost zlepšit se může zapříčinit, že indikované dávky budou nepatrné nebo nedostačující.

Psychologický aspekt

„Mysl, emoce a přístup pacienta hrají roli jak v rozvoji nemoci, rakovinu zahrnujíc, tak v reakci / odezvě pacienta na jakoukoli formu léčení“ Air Force Major O. Carl Simonton, M.D.

Vznik rakoviny může být ve vzájemném vztahu s množstvím minulých krizí, způsobených tak jako na společenské úrovni tak na osobní úrovni; typickými ztrátou osobní orientace nebo snížením ega způsobeného množstvím rozvatů jako jsou pracovní a společenský neúspěch, ztráta blízké osoby, rozvod, deprivace. V tomto případě takto frustrovaný pacient vnímá svou nemoc jako “formu společensky přijatelné sebevraždy”.

Pacient, který je sám proti sobě (frustrován), by měl být odhalen lékařem, který mu vysvětlí nesprávný mechanismus jeho myšlení, když používá vlastní nemoc na prohloubení jeho osobních psychologických objektů, což udržuje jeho myšlení a chování permanentně negativním navzdory objektivním přínosem léčebné terapie.

Pacienti (spolu s jejich rodinami) by měli být podporováni vytvářet a rozvíjet zájmy mimo jejich nemoci, protože takto koná většina úspěšných pacientů. Zahájením léčby B17 se dostaví množství úlevy, opatřeními na záchranu bolesti a odstraněním dalších symptomů se postupně ztratí vzpomínky na nemoc.

PROVÁDĚNÍ ZMĚN

Proměň svou koupelnu

V každé běžné koupelně se nachází množství škodlivých ingrediencí dřívějšího použití, což bychom měli odstranit jednou ranou. Společnost NEWAYS nabízí balík Convert Your Bathroom Pack, který obsahuje šampon, kondicionér, sprchový gel, holicí gel, deodorant, zubní pastu a ústní vodu, které neobsahují škodlivé ingredience a navíc jsou vysoké kvality. Ať už jste na metabolické léčbě B17 nebo jste jen prostě zainteresovaní v prevenci proti rakovině, měli byste odstranit z koupelny veškerý narůstající jedovatý útok na vaše tělo a ruce ve formě škodlivých spotřebitelských produktů. Množství produktů společnosti NEWAYS si můžete pořídit od firem, které prodávají výživové doplňky.

POZNÁMKY O CHOVÁNÍ nádor BĚHEM metabolických LÉČBY B17

Metastázy v kostech se zobrazují na rentgenu jako řídké / tenké oblasti s neostrými / nejasnými obrysy (ohraničením). Během prvních pár měsíců léčby vitamínem B17 doplněné o podpůrný vápník (jako vápno di-rotate) se nádor na rentgenu jeví mírně větší ale s jasně ohraničenými obrysy. Stoupající ohraničení obrysů nádoru je interpretováno jako RE - kalcifikace (znovuzavápňování), což je možné pozorovat na rentgenu a tento defekt (místo napadené nádorem, řídká oblast) se postupně uzavírá. Kompletní vyplnění defektu může trvat 5-8 měsíců. (Nieper, Lanpar Conference, 5 / 73)

Klidné oblasti poranění, resp. poškození v plicích můžeme pozorovat na rentgenu během prvních osmi týdnů metabolické léčby B17. Současně však pacient pozoruje známky jako nárůst hmotnosti, zvýšení síly a skvělý pocit, což jsou indikátory Přemíra infiltrace (proniknutí) jako skutečný výsledek fibroplazie a ne nového nárůstu nádoru. Představují místa, kde se odehrávají úspěšné nápravy nemoci.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ progresi klinického

1. Snížení bolesti, indikováno snížením dávek a frekvence podávání sedativ či narkotik
2. Zvýšení pocitu dobrých / příjemných emocí
3. Zvýšení chuti k jídlu
4. Úbytek / vymizení fetoru (zápachu) z nemoci
5. Zvýšení energie či životaschopnosti
6. Zvýšení tělesné váhy
7. Zvýšení svalové síly
8. Zlepšení krevního rozboru a rozboru moči
9. Zvýšení regenerace tkání
10. Snížení otoku

11. Snížení produkce pravděpodobných chorionických / zánětlivých gonadotropinů v séru moči, zjišťující se krevními testy
12. Návrat symptomů při podávání placebo nebo přerušení léčby
13. Zmírnění symptomů při opětovném najetí na přerušenu léčbu.

VITAMIN B17 A ANÉMIE ERYTROCYTŮ

Úspěšné použití kyanatanů na zvládnutí erytrocytické krize bylo klinicky i výzkumně indikováno (ukázáno). Thiokyanatan (rodanid), meziprodukt metabolismu vitamínu B17 je považován za účinnou látku. Doporučená denní dávka vitamínu B17 je 50-100 mg pro malé děti a 250-500 mg pro dospělé (s touto chorobou).

PROPOJENÍ fluoridace S RAKOVINY

Podle studií na základě US VITAL STATISTICS (Amerických statistik v životním zájmu) pro fluorizaci versus nefluorizaci míst v USA se ukázal prokazatelný, s více než 99 % jistotou, nárůst počtu úmrtí na rakovinu způsobených během prvních 2 let umělé fluorizace. Zvýšené hodnoty nad normál byly naměřeny v 9 -ti orgánech:

Ústa (15 %), Jícen (48 %), žaludek (22 %), tenké střevo (31 %), konečník (51 %), ledviny (10 %), močový měchýř a močové orgány (22 %), další orgány především ženská prsa (15 %), vaječníky a vejcovody (15 %).

Pacienti s rakovinou těchto orgánů, by neměly pokračovat v pití a vaření městské fluoridované vody ale měli by požívat lahvovou přírodní vodu, resp. destilovanou vodu.

KONTAKTY

NEWAYS International:

Společnost Neways dodává nesmírnou škálu produktů osobní hygieny a všeobecné péče o tělo, které neobsahují podezřelé karcinogeny či zdraví nebezpečné komponenty. Mezi jejich produkty extrémně vysoké kvality patří: kosmetika, šampony, kompletní balíček do koupelny, a mnoho produktů denno - denní péče. Neways se také věnuje oblasti kompletních výživových produktů, jako jsou maxima, Reven, Purge, Hawaiian Noni a Cassie - čaj. Tyto produkty se zpracovávají extra čistými procedurami, což zaručuje jejich kvalitu a ryzost. Kompletní škálu těchto produktů s podrobným popisem a informacemi souvisejícími najdete v kontaktu uvedeném níže:

The Vitamin Service LTD

United Kingdom Tel: 01702 470 923

Outside the UK: + (44) 1702 470 923

UK Fax: 01702 471 475 / Outside UK Fax: + (44) 1702 471 475

Produkty B17 metabolické léčby:

Společnost The Vitamin Service LTD má na skladě meruňkové jádérka, enzymy, vitamín A & E emulzi, ostatní produkty potřebné pro fázi I., II. Metabolické léčby a další výživové doplňky. Všechny produkty je možné pořídit na tomto kontaktu

The Vitamin Service, LTD

8 Madeira Avenue, Leigh - on - Sea, Essex, SS9 3EB, United Kingdom

Internet Ordering: <http://www.vitserve.com>

UK telephone orders: 01702 470 923

International telephone orders: + (44) 1702 470 923

UK Fax orders: 01702 471 475

International fax orders: + (44) 1702 471 475

E - mail:supplies@thevitaminservice.com

Informační zdroje metabolické léčby B17

Americká společnost American Media / Reality Zone distribuuje knihy, videa, videokazety, záznamy a informační materiál o metabolické léčbě B17 a prevenci. Společnost American Media také poskytuje reference na lékaře a kliniky:

American Media / Reality Zone

PO Box 4646

Thousand Oaks, CA 91359 USA

Internet Ordering: <http://www.realityzone.com>

International telephone orders: (805) 498-2333

International fax orders: (805) 498-4868

E - mail: info@realityzone.com

Informace o obdržení dodatečných kopií této brožury:

Worldwithoutcancer.org.uk

<http://www.worldwithoutcancer.org.uk>

e - mail:info@worldwithoutcancer.org.uk

Phone UK 01702 480934

Kopie této knihy pro přátele a známé si můžete pořídit vstupem na naše webovou stránku <http://www.worldwithoutcancer.org.uk>. Přesnou kopii brožury si můžete jednoduše stáhnout nebo vytisknout zdarma a to použitím Adobe Acrobat Reader nebo jen stačí kliknout na tlačítko "tisk / print" našeho webového vyhledávače. Ujistěte se, že kliknete na linku s názvem "Print brochure" nebo prostě jděte na: <http://www.worldwithoutcancer.org.uk>

Tvrdou vazbu této brožury je také možné získat zakoupením. Všechny objednávky na tuto publikaci budou mít přiloženy také zdarma zvukovou nahrávku pod názvem: World Without

Cancer, The Story of Vitamin B17. Je to zvuková adaptace dokumentárního filmu, vysvětlující vědeckou racionální léčbu laetrilu. Prezentuje důkazy, že rakovina je stejně jako kurděje a pellarga, onemocnění deficitu (nedostatku). Není způsobena nějakým mystickým virem či X - faktorem ale nedostatkem důležitého stravovacího faktoru, který se stále více narůstající měrou mizí ze stravy moderního člověka. Přirozené stravování kultur, kde je rakovina vzácná, byla zkoumána a bylo zjištěno, že jejich stravování je 200 krát výživnější než strava naší průmyslové společnosti. Chybějícím stravovacím faktorem je pojmenován amygdalin nebo vitamin B17, ale v jeho koncentrované a čisté formě, zdokonalené pro léčbu rakoviny je známý pod názvem laetril (Laetrile). Odprezentovaný je i teoretický model fungování laetrilu na biologické bázi. Také jsou tam zahrnuty i dramatické příběhy pacientů s konečným stádiem rakoviny, kteří se vyléčili díky léčbě laetrilu. Tato zvuková nahrávka je také dostupná (zdarma) ke stažení na naší webové stránce. Trvání záznamu 1 hodina.

Doporučená klinika:

Oasis of Hope Hospital

P.O. box 439045

San Ysidro, California 92143 USA

President: dr. francisco Contreras

Director: Daniel Kennedy

Phone UK 01702 480934

Pokud byste si přáli kontaktovat lékaře z kliniky OASIS OF HOPE, prosím kontaktujte je na těchto kontaktech:

<http://www.worldwithoutcancer.org.uk>

Phone 01702 480934

V BOHU JE VÍRA

"Toto jsou věci, které jednat budete. Mluvte pravdu každý s blízkým svým, sudte spravedlivě a vynášejte spravedlivé a mírové soudy. " (Zachariáš 8:16)

" Každý z vás musí odložit faleš a mluvit pravdivě bližnímu svému, protože jsme všichni z jednoho těla. " (Efesiáns 4:25)

"Pak poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. " (Jan 8:32)

POZNÁMKY

1. Dávkování injekčního amygdalinu závisí na stádiu rakoviny a je od 3 do 15 g denně.
2. Aplikace je pomalou injekcí.
3. Nejúčinnější je však podávání amygdalinu (práškového) v infuzi spolu s vodou a NaCl (5 %), DMSO a vitamínem C po dobu 30 minut až 2 hodiny, čím déle, tím lépe (viz protokol Dr. Manner). NaCl není žádoucí, pokud se nepodává vitamin C, stačí injekční voda. Tato aplikace je výhodná zejména v případě, kdy lékař či sestra nejsou ochotni amygdalin podat. V takovém případě stačí, když lékař / sestra jen zavede pacientovi kanylu a pacient se sám napojí na infuzi.
4. Pokud je pacient úplně "odepsána" a nikdo není ochoten amygdalin podat a nemoc ohrožuje život, jsou pacienti, kteří si podají injekci sami. Injekci si do žíly vědí píchnout narkomani, není to raketová věda.

POUŽITÁ LITERATURA

- Clinical Oncology for Medical Students and Physicians, op. cit, pp.32, 34
- Spontaneous Regression of Cancer:" The Metabolic Triumph of the Host ! ", Op. cit., pp. 136, 137.
- Manner, HW, Michaelson, TL, and DiSanti, SJ. " Enzymatic Analysis of Normal and Malignant Tissues. " Presented at the Illinois State Academy of Science, April 1978. Also, Manner, HW, Michaelson, TL, and DiSanti, SJ, " Amygdalin, Vitamin A and Enzymes Induced Regression of Murine mammary adenocarcinoma ", Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Vol. 1, No. 4, December 1978. 200 East Roosevelt Road, Lombard, IL 60148 USA
- Vitamin B15 (Pangamic Acid) ; Properties, Functions, and Use. (Moscow:Science Publishing House, 1965), translated and reprinted by McNaughton Foundation, Sausalito, Calif. (to see a copy go to <http://www.vitaminb15.com>)
- Catalonia, et al. Medical World News, 6/23/72, pg 82M California cancer Advisory council, 1963, pg 10
- Weilerstein, R. W., ACS Volunteer, 19, # 1, 1973
- Burger, Hospital Practice, July, 1973, 55-62
- Currie & Bagshawe, Lancet, 1, (7492), 708, 1967
- Abercrombie, Ca. Res. 22, 525, 1962
- Cormack, Ca. Res. 30, (5), 1459, 1970
- Catalonia, et al. Medical World News, 6/23/72, pg 82M
- Jose, Nut. Today, March, 1973, pgs 4-9
- Burk & Winzler, VITAMINS AND hormonu, vol.. II, 1944
- Adcock et al, Science, 181, 8/31/73, 845-47

• Dr.. Dean Burk formerly chief of cytochemistry, The National cancer institute, and dr. John Yiamouyiannis, Science Director of The National Health Federation, Formerly an editor of chemical Abstracts.

- Fairley, Brit. Med. J. 2,1969, 467-473
- Burk, McNaughton, Von Ardenne, PanMinerva Med. 13, # 12, Dec. 1971
- Lea, et al, ca. Res. 35, 2321 -2326, Sept. 1975
- The McNaughton Foundation, I.N.D. 6734, April 6, 1970
- Nieper, Krebsgeschehen, 4,1972
- J.A.M.A. 225, 4, July, 1973, pg 424
- Shamberger et al, Proc. Nat, Acad. Sci. May, 1973
- Shute & Shute, ALPHA tocopherol IN Cardiovascular DISEASE, Ryerson Press, Toronto, Canada, 1954
- Ransberger, 10th Int. Cancer Congress, 1970
- Wolf & Ransberger, ENZYME THERAPY, Vantage Př. 1972
- Summa ; DIPI. Ing. (chem.) Landstuhl, 1972
- Reitnauer, Arznei. Forsch. 22, 1347-61, 1972
- Folkman, Ann. Surg. 175, (3). 409-1 6, 1972
- Penn, 7th Annual Cancer Conf. 1973
- The MEDICAL LETTER, vol.. 15, # 3 (issue # 367) 2/2/73
- Kreuger, Advances IN PHARM. & Chemotherapy, vol. x, 1973
- Prejean & Griswold, NCI Progress Rep. (So. Res. Inst..) 9 /72
- Annals New York Academy of Science:164, 2, 1969
- Sorbo, Acta Chem. Scandal. 5, 1951, (724-34) ; 1953 (1129-1136) ; 1953 (1137-1145)
- Clemedson et al, Acta Physio. Scandal. 32, 1954, 245
- Engel, Med. Klink. 20, 1790, 1930
- DeFermo, Arch. Ital. de Chir. 33:801, 1933
- Saphir, ~ Endocrinol. 18, 191, 1934

- Velasquez & Engel, Endocrinol. 27, 523, 1940
- Li, Med. Clin N. Am. 45, 661 -666, May, 1961
- Roff, Bol. Inst.. de Med. 21, 41 9-586, 1944
- Friedman, Ann. N.Y. Acad. Sci. 80-1 61, 1959 (and refs)
- Krebs & Gurchot, Science, 104, 302, 1946
- Braunstein, et al, Annals Int. Med. 78:39-45, 1973
- Naughton et al, Ca. Res. 35, 1887-1 890, July, 1975
- Wide & Gemzell, Acta Endocrinol. 35-261, 1960
- Navarro, 9th International Cancer Congress, Toyko, Oct. 1966
- reported in HEALTH AND LIGHT, by John Ott, D.Sc., Devin Adair, 1973
- Nieper, Agressologie 12, 6,1971, 401-8
- Livingston, CANCER:A NEW Breakthrough, Nash Publishing, Los Angeles, 1972
- Benno C. Schmidt, chairman of the Memorial Sloan - Kettering Cancer Center, New York City, chairman of The President 's
- Cancer Panel; address to the ACS, California Division, Oct. 12, 1973 (Los Angeles Times)
- Yudkin, SWEET AND DANGEROUS, Bantam Books, 1972
- Seminars on Healing, The Academy of Parapsychologie and Medicine, June 1973
- Torrance & Schnabel, Ann. Intern. Med. 6, 732, 1932
- Leiva & Schnabel, Am. I. Med. Sd. 183, 381, 1932
- Gillette, et al, I. Clin. Invest. 51, 36a, 1972
- Gillette, et al, New Eng. J. Med. 290, 654, 1974

- Cerami & Manning, Prac. Nati. Acad. Sci. 68, 1180, 1971
- Gillette et al, ibid, 68, 2791, 1971
- Cerami, et al, Fed. Proc. 32, 1668, 1973
- Manning, et al, Adv. Exp. Med. Biol. 28, 253, 1972

- Houston, Am. Laboratory, 7, # 10, October, 1975 (and editorial)
- Delange & Ermans, Am. J. Clin. Nutr. 24, 1354, 1971
- Barnes, Broda, MD, HEART ATTACK RARENESS IN Thyroid - treated PATIENTS, CC Thomas, 1972
- Barnes and Galton, Hypothyroidism, THE UNSUSPECTED illness, Thomas Y. Crowell, N.Y., Feb. 1976
- Smith, J. C. Medical Counterpoint, Nov. 1973
- Oberleas, Intntl. Trace Elements Symp. Modern Med., Sept. 16, 1974
- New Scientist, 5/2/74
- Korán, B.D., Nature, 4/12/74
- Klenner, FR., J. So. Med. & Surg. 111, 209, 1949
- Stacpoole, P.W., Med. Hyp., March- April, 1975

Tato kniha / brožura je výsledkem souhrnu více než 70 letých zkušeností s vitamínem B17, sebraného v spisů a komunikací následujících lékařů a vědců:

Dr Ernest T. Krebs, jr.. Ph.D., D.Sc.

Dr Ernest T. Krebs, Sr. M.D.

Dr N. R. Bouziane, M.D.

Dr. Dean Burk, Ph.D.

Dr. Ernesto Contreras, M.D.

Dr. Francisco Contreras, M.D.

Dr. Harold Manner, M.D.

Dr. Philip Binzel, M.D.

Dr. Christian Deckers, M.D.

Dr. Ettore Guidetti, M.D.

Dr. Charles Gurchot, Ph.D.

Dr. D. Hamilton, M.D.

Dr. Maurice Kowan, M.D.

Dr I. Maisin, jr.. M.D.

Dr I. Maisin, sr. M.D.

Dr. Leon Lewis, M.D.

Dr. John A. Morrone, M.D.

Dr. Manuel Navarro, M.D.

Dr Hans A. Nieper, M.D.

Dr. Emory Thurston, Ph.D., D.Sc.

Dr Prof. Manfred Von Ardenne

Dr. John A. Richardson M.D.A

mnoho dalších lékařů a vědců, jejichž odborné příspěvky již od roku 1920 položili základ pro současný stav fyziologického umění řídit metabolickou chorobu rakovinu s vitamínem B17.